Листок-вкладыш – информация для пациента

Бравадин, 5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бравадин, 7,5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: ивабрадин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Бравадин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Бравадин.
3. Прием препарата Бравадин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Бравадин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Бравадин, и для чего его применяют

Препарат Бравадин содержит действующее вещество ивабрадин. Относится к группе «средства для лечения заболеваний сердца; другие препараты для лечения заболеваний сердца».

Показания к применению

Препарат Бравадин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет.

Симптоматическая терапия стабильной стенокардии

Симптоматическая терапия стабильной стенокардии при ишемической болезни сердца у пациентов с нормальным синусовым ритмом и частотой сердечных сокращений не менее 70 ударов в минуту:

- при непереносимости или наличии противопоказаний к применению бета-адреноблокаторов;
- в комбинации с бета-адреноблокаторами при неадекватном контроле стабильной стенокардии на фоне оптимальной дозы бета-адреноблокатора.

Терапия хронической сердечной недостаточности

Терапия хронической сердечной недостаточности II–IV функционального класса по классификации NYHA с систолической дисфункцией у пациентов с синусовым ритмом и частотой сердечных сокращений не менее 70 ударов в минуту в комбинации со стандартной терапией, включающей в себя терапию бета-адреноблокаторами, или при непереносимости или наличии противопоказаний к применению бета-адреноблокаторов.

Способ действия препарата Бравадин

О стабильной стенокардии (обычно ее называют «стенокардия» или «грудная жаба»)

Если сердце не получает достаточное количество кислорода, развивается заболевание сердца – стабильная стенокардия. Обычно оно проявляется в возрасте от 40 до 50 лет. Наиболее распространенным признаком стенокардии является боль или дискомфорт в области груди. Стенокардия чаще всего возникает в ситуациях, когда сердце бьется быстрее обычного, например, при физической нагрузке, эмоциональных переживаниях, на холоде или после еды. Если у Вас стенокардия, учащение сердечных сокращений может привести к появлению боли в области груди.

О хронической сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность – это сердечно-сосудистое заболевание, которое возникает в случае, когда Ваше сердце не может обеспечить достаточное количество крови для потребностей организма. Наиболее распространенными признаками сердечной недостаточности являются одышка, утомляемость, повышенная усталость и отеки лодыжек.

Как действует препарат Бравадин

Препарат Бравадин, в основном, снижает частоту сердечных сокращений на несколько ударов в минуту. Это уменьшает потребность сердца в кислороде, особенно в ситуациях, когда вероятно развитие приступа стенокардии. Таким образом, препарат Бравадин помогает предотвращать приступы стенокардии и уменьшить их количество.

Увеличение частоты сердечных сокращений отрицательно влияет на работу сердца и ухудшает прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Поэтому специфическое действие ивабрадина (снижение частоты сердечных сокращений) помогает улучшить работу сердца и прогноз у таких пациентов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Бравадин

Противопоказания

Не принимайте препарат Бравадин:

- если у Вас аллергия на ивабрадин или на любые другие компоненты данного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас слишком редкий пульс в состоянии покоя до начала лечения (менее 70 ударов в минуту);
- если у Вас серьезное состояние с низким артериальным давлением, при котором необходимо лечение в стационаре (кардиогенный шок);
- если у Вас острый сердечный приступ (острый инфаркт миокарда);
- если у Вас очень низкое артериальное давление (систолическое «верхнее» артериальное давление – менее 90 мм рт. ст. и диастолическое «нижнее» артериальное давление – менее 50 мм рт. ст.) (тяжелая артериальная гипотензия);
- если у Вас тяжелое заболевание печени;
- если у Вас нарушение сердечного ритма в виде синдрома слабости синусового узла;
- если у Вас нарушение проводимости в сердце (синоатриальная блокада);
- если у Вас внезапно развилась сердечная недостаточность (острая сердечная недостаточность) или у Вас отмечается ухудшение течения сердечной недостаточности (декомпенсация сердечной недостаточности);
- если у Вас установлен искусственный водитель ритма сердца (электрокардиостимулятор), работающий в режиме постоянной стимуляции;

- если у Вас тяжелая форма стенокардии, при которой боли в области груди возникают очень часто при физической нагрузке или без нее (нестабильная стенокардия);
- если у Вас тяжелое нарушение проводимости в сердце (атриовентрикулярная блокада II и III степени);
- если Вы принимаете препараты для лечения грибковых инфекций (например, кетоконазол, итраконазол), антибиотики группы макролидов (например, джозамицин, кларитромицин, телитромицин или эритромицин для приема внутрь), препараты для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, (ВИЧ-инфекции) (например, нелфинавир, ритонавир) или нефазодон (препарат для лечения депрессии);
- если Вы принимаете верапамил или дилтиазем (препараты для лечения повышенного артериального давления или стенокардии);
- если Вы беременны или пытаетесь забеременеть или если Вы женщина, способная к деторождению, и не используете надежные методы контрацепции;
- если Вы кормите ребенка грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Бравадин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно предупредите лечащего врача до начала лечения, если у Вас имеется в настоящий момент или имелось когда-либо в прошлом любое из нижеуказанных состояний или заболеваний:

- Вы имеете нарушение ритма или проводимости сердца (могут проявляться нерегулярным сердцебиением, ощущением учащенного сердцебиения, усилением боли в груди), или у Вас постоянная форма мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий – разновидность нарушений сердечного ритма), или выявлено отклонение от нормы на электрокардиограмме (ЭКГ), которое называется «синдром удлиненного интервала QT»;
- у Вас отмечаются такие симптомы, как повышенная утомляемость, головокружение или одышка. Это могут быть признаки выраженного замедленного сердцебиения (брадикардия);
- у Вас отмечаются симптомы, которые могут свидетельствовать о мерцательной аритмии (например, частота сердечного ритма в состоянии покоя более 110 ударов в минуту) или выявлены другие типы аритмий, связанные с функцией синусового узла;
- Вы недавно перенесли нарушение мозгового кровообращения (инсульт);
- у Вас очень низкое или умеренно низкое артериальное давление;
- у Вас не поддающееся лечению высокое артериальное давление (неконтролируемая артериальная гипертензия);
- у Вас тяжелая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в сочетании с отклонением от нормы на ЭКГ, называемым «блокада ножки пучка Гиса»;
- у Вас хроническое заболевание сетчатки глаза;
- у Вас заболевание печени средней степени тяжести;
- у Вас тяжелое заболевание почек.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Бравадин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Если Вы принимаете один из нижеперечисленных препаратов, обязательно проинформируйте

об этом лечащего врача, так как может потребоваться коррекция дозы препарата Бравадин или наблюдение за Вашим состоянием:

- флуконазол (противогрибковый препарат);
- рифампицин (антибиотик);
- барбитураты (для лечения эпилепсии и нарушений сна);
- фенитоин (для лечения эпилепсии),
- препараты Зверобоя продырявленного (растительные препараты для лечения депрессии);
- препараты, удлиняющие интервал QT на ЭКГ (для лечения нарушений сердечного ритма или других состояний):
  - хинидин, дизопирамид, ибутилид, соталол, амиодарон (для лечения нарушений сердечного ритма);
  - бепридил (для лечения стенокардии);
  - пимозид, зипразидон, сертиндол (для лечения тревоги, шизофрении или других заболеваний психики);
  - мефлохин или галофантрин (для лечения малярии);
  - эритромицин для внутривенного введения (антибиотик);
  - пентамидин (для лечения инфекций, вызванных простейшими);
  - цизаприд (для лечения нарушений моторики желудочно-кишечного тракта);
- калийнесберегающие мочегонные препараты (диуретики), которые могут снижать содержание калия в крови.

Препарат Бравадин с пищей и напитками

Во время лечения препаратом Бравадин по возможности избегайте употребления грейпфрута и грейпфрутового сока.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не принимайте препарат Бравадин, если Вы способны к рождению детей и не используете надежные методы контрацепции (см. подраздел «Противопоказания»).

Беременность

Не принимайте препарат Бравадин, если Вы беременны или планируете беременность (см. подраздел «Противопоказания»). Если Вы беременны и приняли или продолжаете принимать препарат Бравадин, сообщите об этом лечащему врачу.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Бравадин, если Вы кормите ребенка грудью (см. подраздел «Противопоказания»). Сообщите лечащему врачу, если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью, поскольку грудное вскармливание следует прекратить, если Вам необходимо принимать препарат Бравадин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Прием препарата Бравадин может привести к появлению кратковременного ощущения повышенной яркости в ограниченной зоне поля зрения (преходящих нарушений световосприятия) (см. раздел 4 листка-вкладыша). Если у Вас возникло такое нарушение световосприятия, будьте осторожны при управлении транспортными средствами или работе с механизмами в ситуациях, когда существует вероятность резкого изменения интенсивности освещения, особенно при вождении в ночное время.

Препарат Бравадин содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Бравадин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в 1 таблетке, покрытой пленочной оболочкой, то есть, по сути, «не содержит натрий».

3. Прием препарата Бравадин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Симптоматическое лечение стабильной стенокардии

Начальная доза не должна превышать 1 таблетку препарата Бравадин 5 мг два раза в сутки. Если у Вас продолжают сохраняться симптомы стенокардии и доза (5 мг два раза в сутки) хорошо Вами переносится, то врач может увеличить дозу.

Поддерживающая доза не должна превышать 7,5 мг два раза в сутки. Лечащий врач подберет необходимую Вам дозу.

Рекомендуемый режим приема препарата: по 1 таблетке утром и вечером.

В некоторых случаях (например, пациентам в возрасте 75 лет и старше) лечащий врач может назначить половину дозы, то есть ½ таблетки Бравадин 5 мг (что соответствует 2,5 мг ивабрадина) утром и ½ таблетки 5 мг вечером.

Лечение хронической сердечной недостаточности

Рекомендуемая начальная доза лекарственного препарата Бравадин – 1 таблетка 5 мг два раза в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 7,5 мг два раза в сутки. Лечащий врач решит, с какой дозы следует начинать лечение.

Рекомендуемый режим приема препарата: по 1 таблетке утром и вечером.

Для пациентов в возрасте 75 лет и старше рекомендуемая начальная доза препарата Бравадин составляет 2,5 мг (по ½ таблетки 5 мг) два раза в сутки. В дальнейшем возможно увеличение дозы препарата.

Путь и (или) способ введения

Препарат Бравадин следует принимать внутрь, во время еды.

Таблетку 5 мг можно разделить на равные дозы.

Если Вы приняли препарата Бравадин больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Бравадин больше, чем следовало, Вы можете почувствовать одышку или выраженную слабость в результате чрезмерного замедления сердцебиения. В этом случае немедленно обратитесь к врачу – Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь.

Если Вы забыли принять препарат Бравадин

Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, не беспокойтесь. Примите ее, как только это будет возможно, и затем продолжайте прием как обычно.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Бравадин

Поскольку лечение стабильной стенокардии и хронической сердечной недостаточности

обычно проводится постоянно, Вам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем прекратить прием данного препарата. Ваше состояние может ухудшиться, если Вы прекратите прием препарата без консультации с врачом.

Если действие препарата Бравадин кажется Вам слишком сильным или недостаточным, обратитесь к лечащему врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к Вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Бравадин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее частые нежелательные реакции данного препарата связаны с его механизмом действия и зависят от дозы.

Прекратите прием препарата Бравадин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций – Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- частые хаотичные нерегулярные сокращения сердца (фибрилляция предсердий).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапно развившийся отек лица, губ, языка или горла с затруднением дыхания или глотания (ангионевротический отек).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- замедленное сердцебиение, сопровождающееся обмороком, головокружением, утомляемостью и другими симптомами (атриовентрикулярная блокада II–III степени);
- нарушение ритма сердца, которое может сопровождаться головокружением, резкой слабостью, утомляемостью, обмороком (синдром слабости синусового узла).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Бравадин

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- зрительные нарушения – кратковременное ощущение повышенной яркости, чаще всего вызванное резкими изменениями освещенности (изменения световосприятия – фосфены). Они также могут быть описаны как ореол, цветовые вспышки, разложение изображения на отдельные части или множественные изображения.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль, особенно в первый месяц лечения;
- головокружение, возможно связанное с замедленным сердцебиением (брадикардией);
- нечеткость (расплывчатость) зрения;
- замедленное сердцебиение (брадикардия);
- неритмичное сердцебиение, которое может ощущаться как перебои в работе сердца, толчки, сильные удары (желудочковая экстрасистолия);
- не поддающиеся лечению высокое/низкое артериальное давление (неконтролируемая артериальная гипертензия/артериальная гипотензия);
- нарушение проводимости сердца на ЭКГ (атриовентрикулярная блокада I степени – удлиненный интервал PQ на ЭКГ).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- высокое количество эозинофилов в крови (эозинофилия);
- высокая концентрация мочевой кислоты в крови (гиперурикемия);
- обморок, возможно связанный с замедленным сердцебиением (брадикардией);
- двоение в глазах (диплопия);
- нарушение зрения;
- ощущение вращения окружающих предметов вокруг тела или, наоборот, тела вокруг окружающих предметов (вертиго);
- ощущение сердцебиения;
- ощущение перебоев в работе сердца (наджелудочковые экстрасистолы);
- пониженное артериальное давление (артериальная гипотензия), возможно связанное с замедленным сердцебиением (брадикардией);
- одышка;
- тошнота;
- запор;
- диарея;
- боль в животе;
- кожная сыпь;
- спазмы мышц;
- необъяснимая слабость и повышенная утомляемость (астения), возможно связанные с замедленным сердцебиением (брадикардией);
- утомляемость, возможно связанная с замедленным сердцебиением (брадикардией);
- повышенная концентрация креатинина в крови;
- нарушение на ЭКГ (удлинение интервала QT на ЭКГ).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- кожный зуд;
- высыпания на коже в виде волдырей, сопровождающиеся зудом (крапивница);
- покраснение кожи (эритема);
- недомогание, возможно связанное с замедленным сердцебиением (брадикардией).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь
ГУ «Госфармнадзор»
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32-2
Телефон: +375 (17) 271 41 76, +375 (17) 242 00 29
Факс: +375 (17) 271 25 75
Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gospharmnadzor.by

5. Хранение препарата Бравадин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер).

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Бравадин содержит

Действующим веществом является ивабрадин.

Бравадин, 5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 5 мг ивабрадина (в виде ивабрадина гидробромида).

Бравадин, 7,5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 7,5 мг ивабрадина (в виде ивабрадина гидробромида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон-К30, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е171), тальк, пропиленгликоль, краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа оксид красный (Е172).

Препарат Бравадин содержит лактозу, натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Бравадин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Бравадин, 5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой бледно-оранжевого цвета, с риской на одной стороне.

Вид на изломе: белая шероховатая масса с пленочной оболочкой бледно-оранжевого цвета.

Таблетку можно разделить на равные дозы.

Бравадин, 7,5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Круглые, слегка двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой бледно-оранжевого цвета, с фаской.

Вид на изломе: белая шероховатая масса с пленочной оболочкой бледно-оранжевого цвета.

По 14 или 15 таблеток в блистере из комбинированного материала ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой.

По 1, 2, 4, 6, 7 блистеров (по 14 таблеток) или 2, 4, 6 блистеров (по 15 таблеток) вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «по рецепту».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Лекарственный препарат зарегистрирован в государствах-членах ЕАЭС под следующими торговыми наименованиями

Государство ЕАЭС	Торговое наименование
Российская Федерация	Бравадин
Республика Беларусь	Бравадин®

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Республика Беларусь
Представительство Акционерного общества «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Республика Словения) в Республике Беларусь
220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25Г, офис 315
Телефон: 8 740 740 9230
Факс: 8 740 740 9230
Адрес электронной почты: info.by@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Июль 2026 г.

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).