

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К. А. Савенков
14 июля 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Дехинел® таблетки
для кошек

(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения /«KRKA, d.d., Novo mesto», Smarjeska cesta 6, 8501
Novo mesto, Slovenia)

Номер регистрационного удостоверения 705-3-10.17-3868№ПВИ-3-10.17/05077

I. Общие требования

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Дехинел® таблетки для кошек (Dehinel® Cats).

группировочное наименование: пирантел + празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Препарат Дехинел® таблетки для кошек в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит пирантела эмбонат - 230 мг и празиквантел - 20 мг, а также вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, микрокристаллическую целлюлозу (E460), поливидон K25, магния стеарат (E572), кремния диоксид коллоидный, гипромеллозу, полиэтиленгликоль 4000, диоксид титана (E171).

3. Препарат по внешнему виду представляет собой двояковыпуклые овальные таблетки, покрытые пленочной оболочкой, от белого до почти белого цвета, с риской на одной стороне.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Половина таблетки хранится в течение 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат Дехинел® таблетки для кошек расфасованным по 2 таблетки в блистеры, упакованные поштучно в коробки. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат Дехинел[®] таблетки для кошек относится к фармакотерапевтической группе – антигельминтные средства в комбинациях.

10. Препарат Дехинел[®] таблетки для кошек обладает широким спектром антигельминтного действия на круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у кошек, в том числе *Toxocara cati* (syn. *mystax*), *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera* (*Taenia*) *taeniaeformis*, *Mesocostoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

Механизм действия празиквантела, входящего в состав препарата, заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротурбулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. Празиквантел быстро всасывается в кишечнике и распределяется во внутренних органах и тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболизированной форме.

Пирантел эмбонат оказывает выраженное нематодоцидное действие, вызывая повышение проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Пирантел эмбонат частично всасывается в кишечнике, быстро метаболизируется и выводится из организма в основном с фекалиями.

Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится кошками разных пород и возраста.

III. Порядок применения

11. Препарат Дехинел[®] таблетки для кошек назначают кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, анкилостомоз) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, мезоцестоидоз).

12. Противопоказанием к применению препарата Дехинел[®] таблетки для кошек является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Не подлежат дегельминтизации котята массой менее 1 кг. Не применять животным с тяжелыми нарушениями функции почек и печени. Не применять сильно истощенным, инфицированным и выздоравливающим животным.

13. При работе с препаратом Дехинел[®] таблетки для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В

случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Поскольку эхинококкоз представляет опасность для человека, при лечении этого заболевания следует соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение человека.

14. Препарат нельзя использовать беременным самкам из-за отсутствия сведений о влиянии препарата на эту группу животных. Препарат также не используют для дегельминтизации котят до трехнедельного возраста, так как у них не выявляется инвазии ленточными гельминтами.

15. Препарат Дехинел[®] таблетки для кошек назначают кошкам в дозе 1 таблетка на 4 кг массы животного (5 мг празиквантела и 57,5 мг пирантела эмбоната на 1 кг массы животного).

Масса кошки, кг	Количество таблеток
1.0 - 2.0	1/2
2.1 - 4.0	1
4.1 - 6.0	1+1/2
6.1 - 8.0	2

Дегельминтизацию кошек с использованием препарата Дехинел[®] таблетки для кошек проводят, начиная с 3- недельного возраста.

Препарат применяют животным индивидуально однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в вышеуказанной дозе.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дехинел[®] таблеток для кошек в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств. В очень редких случаях могут наблюдаться неврологические нарушения (например, атаксия). При возникновении аллергической реакции лечение следует прекратить и начать прием антигистаминных препаратов и симптоматическую терапию.

17. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено. При значительной передозировке может наблюдаться депрессия, отказ от еды, повышенное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота. В таких случаях начинают прием энтеросорбентов и симптоматическую терапию.

18. Не рекомендуется применять препарат Дехинел[®] таблетки для кошек с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможного снижения эффективности. Одновременное применение с левамизолом и холинергическими соединениями может привести к токсическому эффекту. Информация о несовместимости препарата с лекарственными препаратами других фармакологических групп, кормами и известными кормовыми

добавками отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат Дехинел® таблетки для кошек не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения*

Держатель РУ/Выпускающий контроль
качества:

АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения

Производитель:

«КРКА-ФАРМА д.о.о.»,
В. Хольевца, 20/Е
10450 г. Ястребарско, Хорватия

или

Держатель РУ:

АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения

Производитель:

«КРКА-ФАРМА д.о.о.»,
В. Хольевца, 20/Е
10450 г. Ястребарско, Хорватия

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
держателем или владельцем
регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата для ветеринарного
применения на принятие
претензий от потребителя

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Московская, д. 50

Телефон: +7 (495) 994 70 70

Факс: +7 (495) 994 70 78

Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Веб-сайт: www.krka.biz

* фактические производственные площадки указаны на вторичной упаковке