СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К. А. Савенков
05 октября 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Дехинел® Плюс

(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto», Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia)

Номер регистрационного удостоверения 705-3-6.13-3148№ПВИ-3-3.7/02282

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Дехинел® Плюс (Dehinel® Plus).

Группировочное наименование: пирантел + празиквантел + фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Препарат Дехинел® Плюс в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит пирантела эмбоната - 504 мг, празиквантела - 175 мг, фебантела - 525 мг, а также вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон К30, натрия лаурилсульфат, микрокристаллическую целлюлозу, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

3. Препарат по внешнему виду представляет собой овальные двояковыпуклые таблетки слегка зеленовато-желтого цвета с фаской и риской на обеих сторонах.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

4. Препарат Дехинел® Плюс выпускают расфасованным по 2 или 6 таблеток в блистеры. Блистеры по 2 таблетки упаковывают в картонные коробки поштучно, блистеры по 6 таблеток упаковывают в картонные коробки по две штуки и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 ºС до 25 ºС.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. Препарат Дехинел® Плюс относится к комбинированным антигельминтным препаратам.

10. Комбинация фебантела, пирантела эмбоната и празиквантела, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на нематод, цестод и простейших рода лямблий (Giardia spp.), паразитирующих в желудочно-кишечном тракте у собак.

Фебантел, входящий в состав препарата, относится к группе пробензимидазолов, активен в отношении нематод родов Ancylostoma, Uncinaria, Toxocara, Toxascaris, Trichocephalus. Механизм действия фебантела заключается в угнетении синтеза белка тубулина и нарушении микротубулярной функции нематод, снижении активности фумаратредуктазы, являющейся ключевым ферментом в энергетическом обмене гельминтов, и прекращении транспорта и всасывания глюкозы, что вызывает гибель нематод. Умеренно всасывается в желудочно-кишечном тракте, биотрансформируется в печени.

Пирантела эмбонат относится к группе пиримидинов, очень плохо всасывается при пероральном введении и оказывает свое действие преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Обладает широким спектром нематоцидного действия, активен в отношении нематод родов Ascaris, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria и других. Блокирует нервно-мышечную передачу импульса у нематод и вызывает паралич мускулатуры гельминта.

Празиквантел – производное пиразинизохинолина, губительно действует на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак, в том числе Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Ehinococcus multilocularis, Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Multiceps multiceps и Taenia spp.

Механизм действия празиквантела заключается в угнетении активности фумаратредуктазы, нарушении проницаемости клеточных мембран и мышечной иннервации, что приводит к параличу и гибели гельминта. Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 60 минут. Выводится из организма в основном с мочой в течение 24 часов.

Дехинел® Плюс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего и гепатотоксического действия.

III. Порядок применения

11. Препарат Дехинел® Плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз) и гиардиозе (лямблиозе).

12. Противопоказанием к применению препарата Дехинел® Плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Препарат не рекомендуется применять собакам массой менее 17,5 кг.

13. При работе с препаратом Дехинел® Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к фебантелу, празиквантелу, пирантелу следует избегать прямого контакта с препаратом.

Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не допускается применение лекарственного препарата щенкам в первые три недели жизни и щенным сукам в первые две трети периода беременности. Препарат разрешено применять самкам в период лактации. Не превышать рекомендованную дозу при лечении беременных сук.

15. Препарат Дехинел® Плюс применяют собакам крупных пород индивидуально перорально однократно в утреннее кормление в дозе 1 таблетка на 35 кг массы животного.

При лечении лямблиоза препарат применяют в рекомендованных дозах в течение 3-х дней подряд.

Перед применением препарата Дехинел® Плюс не требуется голодной диеты и использования слабительных средств.

В случае интенсивной инвазии нематодами рекомендуется повторное введение препарата через 14 дней в той же дозе. С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально, а также перед вакцинацией и спариванием в терапевтической дозе.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дехинел® Плюс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В очень редких случаях сообщалось о рвоте и/или диарее. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение препарата Дехинел® Плюс прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки у собак не выявлены.

18. Не допускается одновременное применение препарата Дехинел® Плюс с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможных антагонистических эффектов. Одновременное применение с другими холинергическими соединениями может привести к токсическому эффекту.

19. Особенностей действия препарата при его первом применении не установлено.

20. Следует соблюдать установленные сроки дегельминтизации собак.

21. Препарат Дехинел® Плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения*	Держатель РУ/Выпускающий контроль качества: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения Производитель: «КРКА-ФАРМА д.о.о.», В. Хольевца, 20/Е 10450 г. Ястребарско, Хорватия или Держатель РУ: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения Производитель: «КРКА-ФАРМА д.о.о.», В. Хольевца, 20/Е 10450 г. Ястребарско, Хорватия
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения на принятие претензий от потребителя	ООО «КРКА-РУС», 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: +7 (495) 994-70-70 Факс: +7 (495) 994-70-78 Адрес эл. почты: krka-rus@krka.biz Веб-сайт: www.krka.biz

* фактические производственные площадки указаны на вторичной упаковке