СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К. А. Савенков
15 сентября 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Флорон® 4% порошок

(организация-разработчик: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto», Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia)

Номер регистрационного удостоверения: 705-3-12.26-5569№ПВИ-3-09.17/05049

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Флорон® 4% порошок (Floron® 4% powder).

Международное непатентованное наименование: флорфеникол.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

В 100 г порошка содержится в качестве действующего вещества 4 г флорфеникола, а в качестве вспомогательных веществ – пропиленгликоль и кальция карбонат.

3. Флорон® 4% порошок по внешнему виду представляет собой порошок белого цвета с легким коричневатым оттенком с возможным включением цветных частиц.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства. После вскрытия упаковки лекарственный препарат необходимо использовать в течение 3 месяцев. Срок годности смеси корма и лекарственного препарата – 3 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат упакован по 10 кг в многослойные бумажные пакеты. Каждая упаковка снабжается инструкцией по применению.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают по рецепту.

II. Фармакологические свойства

9. Флорон 4% порошок относится к антибактериальным препаратам.

10. Флорфеникол, входящий в состав препарата, представляет собой производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом фтора, оказывает бактериостатическое действие на чувствительные микроорганизмы, в протоплазме бактериальной клетки связывается с рибосомной субъединицей 70S, где блокирует фермент пептидилтрансферазу, что приводит к торможению синтеза белка у чувствительных бактерий на уровне рибосом.

Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolitica, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Micoplasma hyopneumoniae, Micoplasma hyorhinis, Salmonella choleraesuis, Staphilococcus aureus, Streptococcus suis и Escherishia coli. Флорфеникол активен против бактерий, которые производят ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.

При пероральном введении флорфеникол хорошо и быстро всасывается из кишечного тракта и проникает во все органы и ткани. Биодоступность флорфеникола после перорального введения составляет 88%. Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается через 1 ч после перорального введения. Антибактериальная концентрация после перорального введения сохраняется в органах и тканях животных в течение 24 часов.

Выделяется флорфеникол из организма преимущественно с мочой и в меньшей степени - с фекалиями: 50 % - в неизмененном виде и 50% - в виде метаболитов, основным из которых является флорфениколамин.

Флорон® 4% порошок по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у поросят побочных явлений и осложнений.

III. Порядок применения

11. Флорон® 4% порошок применяют свиньям с лечебной и лечебно-профилактической целью при заболеваниях бактериальной этиологии: плевропневмонии, вызванной Actinobacillus pleuropneumoniae и/или Haemophilus parasuis, атрофическом рините, вызванном Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, сальмонеллезе, а также других инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

12. Противопоказанием к применению препарата Флорон® 4% порошок является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени и почек.

13. При работе с препаратом Флорон® 4% порошок необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.

Людям с гиперчувствительностью к флорфениколу следует избегать прямого контакта с препаратом Флорон® 4% порошок. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применение препарата Флорон® 4% порошок свиноматкам в период беременности и лактации, а также хрякам-производителям.

15. Флорон® 4% порошок применяют с кормом в суточной дозе 5-10 мг флорфеникола на 1 кг массы животного (что соответствует 125-250 мг препарата на 1 кг массы животного или 2,5-5 кг препарата на тонну корма) в течение 5 дней подряд.

При групповом применении расчетное количество (доза) лекарственного препарата вносится в кормосмесь с помощью калиброванного дозирующего устройства. Рекомендуется вносить лекарственный препарат в смеситель, содержащий компоненты корма, после чего перемешивать до получения однородной смеси лекарственного препарата с кормосмесью. Допускается кондиционирование паром смеси лекарственного препарата с кормом при температурах не выше 85 °С и последующее гранулирование (пеллетирование) кормосмеси.

При индивидуальном лечении отдельных животных расчетное количество (доза) лекарственного препарата вносится и равномерно распределяется в небольшом количестве корма, который должен скармливаться перед основным кормлением. Максимальная концентрация флорфеникола не должна превышать 500 мг флорфеникола на 1 кг корма. Более высокие концентрации могут привести к ухудшению поедаемости и снижению потребления корма.

16. При применении препарата Флорон® 4% порошок у свиней может проявиться покраснение перианальной области и мягкий кал. Данные изменения самопроизвольно проходят и не требуют лечения.

17. При передозировке у свиней наблюдается диарея.

18. Не допускается одновременное применение препарата Флорон® 4% порошок с тиамфениколом и хлорамфениколом. Не рекомендуется смешивать препарат Флорон® 4% порошок с другими лекарственными средствами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток после последнего применения препарата Флорон® 4% порошок. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	Держатель РУ/Выпускающий контроль качества: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения Производитель: АО «КРКА, д.д., Ново место», Повхова улица 5, 8000 Ново место, Словения
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения на принятие претензий от потребителя	ООО «КРКА-РУС», 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Телефон: +7 (495) 994-70-70 Факс: +7 (495) 994-70-78 Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz Веб-сайт: www.krka.biz