Листок-вкладыш – информация для пациента

Глипвило Мет, 50 мг + 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Глипвило Мет, 50 мг + 1000 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующие вещества: вилдаглиптин + метформин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глипвило Мет, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Глипвило Мет.
3. Прием препарата Глипвило Мет.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Глипвило Мет.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глипвило Мет, и для чего его применяют

Препарат Глипвило Мет содержит два действующих вещества: вилдаглиптин и метформин, которые помогают контролировать содержание сахара в крови. Препарат относится к группе лекарственных средств, которая называется «средства для лечения сахарного диабета; гипогликемические средства, кроме инсулинов; комбинации пероральных гипогликемических средств».

Показания к применению

Препарат Глипвило Мет применяется у взрослых в возрасте от 18 лет с сахарным диабетом 2 типа (в сочетании с диетотерапией и физическими упражнениями):

- при недостаточной эффективности монотерапии вилдаглиптином или метформином;
- у пациентов, ранее получавших комбинированную терапию вилдаглиптином и метформином в виде монопрепаратов;
- в комбинации с производными сульфонилмочевины (тройная комбинированная терапия) у пациентов, ранее получавших терапию производным сульфонилмочевины и метформином без достижения адекватного контроля гликемии;
- в тройной комбинированной терапии с инсулином у пациентов, ранее получавших инсулинотерапию в стабильной дозе и метформин без достижения адекватного контроля гликемии;
- в качестве начальной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при недостаточной эффективности диетотерапии, физических упражнений и при необходимости улучшения контроля гликемии.

Способ действия препарата Глипвило Мет

Сахарный диабет 2 типа развивается в том случае, если организм не вырабатывает инсулин в достаточном количестве, или если инсулин, вырабатываемый организмом, не выполняет свои функции надлежащим образом. Заболевание также может развиться в том случае, если в организме вырабатывается чрезмерное количество глюкагона.

Инсулин – это вещество, которое помогает снижать содержание сахара в крови, в особенности после приема пищи. Глюкагон – это вещество, которое стимулирует выработку сахара в печени, что приводит к повышению содержания сахара в крови. Оба эти вещества вырабатываются поджелудочной железой.

Механизм действия препарата Глипвило Мет заключается в увеличении выработки инсулина и уменьшении выработки глюкагона (эффект вилдаглиптина) в поджелудочной железе, а также повышении эффективности использования инсулина, вырабатываемого в организме (эффект метформина). Препарат Глипвило Мет помогает контролировать содержание сахара в крови.

Важно продолжать придерживаться рекомендованной диеты и (или) программы физических нагрузок в период лечения препаратом Глипвило Мет.

Если у Вас есть вопросы по поводу того, как действует препарат Глипвило Мет и почему он Вам назначен, обратитесь к лечащему врачу.

Через 3–6 месяцев после начала приема препарата Глипвило Мет Ваш лечащий врач проверит результаты лечения. В том случае, если препарат Вам недостаточно помогает или выявятся потенциальные риски его применения, врач изменит Вам лечение.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Глипвило Мет

Противопоказания

Не применяйте препарат Глипвило Мет:

- если у Вас имеется аллергия на вилдаглиптин, метформин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас почечная недостаточность или нарушение функции почек тяжелой степени (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/1,73 м^2);
- если у Вас острое состояние, в результате которого может развиться нарушение функции почек:
  - обезвоживание (дегидратация) в результате повторной рвоты, диареи;
  - лихорадка, тяжелое инфекционное заболевание;
  - состояние гипоксии (шок, сепсис, инфекции почек, бронхолегочное заболевание);
- если у Вас клинически выраженные проявления острых или хронических заболеваний, которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии (в том числе, острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность с нестабильными показателями гемодинамики, дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда);
- если у Вас нарушение функции печени, в том числе повышение активности «печеночных» ферментов (аланинаминтрансферазы или аспартатаминотрансферазы в 3 и более раз выше верхней границы нормы);
- если у Вас в настоящее время или были ранее (в анамнезе) тяжелые осложнения сахарного диабета, включая диабетический кетоацидоз (осложнение, сопровождающееся быстрым снижением массы тела, тошнотой или рвотой),

диабетическая прекома, кома;
- если у Вас повышено содержание молочной кислоты в крови (лактатацидоз) в настоящее время или это было ранее (в анамнезе);
- в течение 48 часов до и не менее 48 часов после проведения радиоизотопных или рентгенологических исследований с внутрисосудистым введением йодсодержащего контрастного вещества;
- если Вам предстоит хирургическое вмешательство или была травма (при которых необходимо введение инсулина);
- если Вам был поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа (при этом заболевании в Вашем организме не вырабатывается инсулин);
- если Вы злоупотребляете алкоголем (у Вас хронический алкоголизм, острая алкогольная интоксикация);
- если Вы соблюдаете диету с низким содержанием калорий (менее 1000 ккал в сутки).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для минимизации рисков препарат следует принимать с осторожностью и находиться под постоянным контролем врача в следующих случаях:

- если у Вас в прошлом (в анамнезе) было воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- если Вы старше 60 лет и выполняете тяжелую физическую работу в связи с повышенным риском развития лактатацидоза;
- если у Вас почечная недостаточность средней степени тяжести (скорость клубочковой фильтрации 30–59 мл/мин/1,73 м^2);
- если Вы уже получаете лечение инсулином, то Вы должны знать, что препарат Глипвило Мет не заменяет инсулинотерапию.

Если что-либо из нижеперечисленного относится к Вам, сообщите об этом лечащему врачу до начала или во время приема препарата Глипвило Мет:

- у Вас нарушение функции печени, в том числе повышение показателей аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы (более чем в 3 раза выше верхней границы нормы). При применении вилдаглиптина были зарегистрированы редкие случаи нарушения функции печени, включая воспаление печени (гепатит). Рекомендуется обследовать функцию печени перед началом лечения препаратом Глипвило Мет, затем контролировать 1 раз в 3 месяца в течение первого года применения препарата, а затем периодически. При повышении указанных показателей в три и более раз выше верхней границы нормы при повторном обследовании прием препарата следует прекратить. В случае развития желтухи или других признаков печеночной недостаточности, применение препарата Глипвило Мет следует немедленно прекратить. После нормализации показателей функции печени прием препарата возобновлять нельзя;
- у Вас симптомы (в том числе в анамнезе) лактатацидоза (см. раздел 4 листка-вкладыша). В случае избыточной потери жидкости организмом (дегидратации) (например, связанной с тяжелой диареей (жидкий стул) или рвотой, лихорадкой (высокая температура) или при уменьшении потребления жидкости), следует немедленно прекратить прием препарата Глипвило Мет и обратиться за медицинской помощью. К другим факторам риска относятся: злоупотребление алкоголем, нарушение функции печени, недостаточный контроль сахара крови, кетоацидоз, продолжительное голодание, состояния, вызывающие снижение содержания кислорода в крови и тканях (гипоксию), а также одновременное применение лекарственных средств, способных вызывать лактатацидоз;

- у Вас нарушение функции почек. Необходимо контролировать их функцию (определять скорость клубочковой фильтрации почек) до начала приема препарата, периодически контролируя данный показатель в процессе лечения;
- Вы принимаете некоторые препараты (например, снижающие артериальное давление (гипотензивные), мочегонные (диуретики), нестероидные противовоспалительные препараты). Их сочетание с препаратом Глипвило Мет может ухудшить функцию почек или распределение метформина (необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с препаратами, способными влиять на функцию почек, а также оказывающими выраженное влияние на показатели функции сердца или подавляющие выведение метформина почками и повышающие его концентрацию в крови);
- Вы злоупотребляете алкоголем. Не рекомендуется употреблять алкоголь в период лечения препаратом Глипвило Мет. Алкогольная интоксикация ассоциирована с увеличением риска развития лактатацидоза, в особенности при длительном голодании, недостаточном питании и нарушении функции печени;
- у Вас недостаточное потребление или нарушение всасывания витамина B_{12}. В этом случае существует предрасположенность к снижению концентрации витамина B_{12} в крови. Прием метформинсодержащих препаратов (в том числе препарата Глипвило Мет) иногда может вызывать бессимптомное снижение концентрации витамина B_{12} в крови, которое в очень редких случаях может приводить к анемии. При выявлении отклонений показателей общеклинического анализа крови от нормы проинформируйте лечащего врача;
- если у Вас развились сердечно-сосудистый коллапс (шок), острая сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда и другие состояния, для которых характерен недостаток кислорода в тканях (гипоксемия). В таких случаях применение метформинсодержащих препаратов, в том числе и препарата Глипвило Мет, следует немедленно прекратить, так как они ассоциированы с лактатацидозом;
- у Вас планируется хирургическое вмешательство с общей или местной анестезией (за исключением малых операций, не связанных с ограничением потребления пищи и жидкости). В таких случаях применение препарата Глипвило Мет следует отменить. Возобновление приема препарата возможно не ранее, чем через 48 часов после вмешательства или после восстановления перорального приема пищи после получения лабораторного подтверждения стабилизации функции почек;
- у Вас пониженное содержание сахара в крови (гипогликемия). Как правило, гипогликемия не отмечается на фоне приема препарата, но такое состояние может развиться на фоне низкокалорийной диеты (когда интенсивная физическая нагрузка не компенсируется калорийностью пищи) или употребления алкоголя. Данное состояние чаще развивается у пожилых, ослабленных или истощенных пациентов;
- у Вас развился стресс (лихорадка, травма, инфекции, хирургическое вмешательство). В таких случаях препарат Глипвило Мет Вам будет временно отменен, лечащий врач обсудит с Вами инсулинотерапию. Возобновление лечения препаратом Глипвило Мет возможно по решению лечащего врача после окончания острого периода.

Если Вы не уверены, применимо ли что-либо из вышеперечисленного к Вам, обсудите это с лечащим врачом, прежде чем начнете прием препарата Глипвило Мет.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Глипвило Мет

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете

начать принимать какие-либо другие препараты.

Это особенно важно, если Вы принимаете нижеследующие препараты, которые вызывают повышение содержания сахара в крови (гипергликемию) и способствуют снижению эффективности гипогликемических средств:

- некоторые лекарственные препараты, применяемые при воспалительных процессах (например, глюкокортикостероиды);
- некоторые лекарственные препараты для снижения высокого артериального давления (например, нифедипин, эналаприл, лозартан, диуретики);
- некоторые лекарственные препараты для облегчения боли (например, диклофенак);
- некоторые лекарственные препараты для лечения боли в груди (стенокардии) (например, ранолазин);
- некоторые лекарственные препараты для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), (например, долутегравир);
- некоторые лекарственные препараты для лечения некоторых типов рака щитовидной железы (медуллярный рак щитовидной железы) (например, вандетаниб);
- некоторые лекарственные препараты для лечения расстройств желудка (например, циметидин);
- некоторые лекарственные препараты для лечения некоторых психиатрических заболеваний (например, фенотиазин);
- некоторые лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы;
- противозачаточные препараты, применяемые внутрь (оральные контрацептивы), а также препараты для облегчения симптомов менопаузы или профилактики остеопороза у женщин (например, эстроген).

При внутрисосудистом введении йодсодержащих контрастных веществ, например, при рентгенографии или сканировании необходимо прекратить прием препарата Глипвило Мет до или во время инъекции. Лечащий врач определит, когда необходимо прекратить лечение и когда возобновить лечение препаратом Глипвило Мет.

Обсудите с лечащим врачом, относится ли принимаемый Вами лекарственный препарат к одному из перечисленных выше средств.

Применение препарата Глипвило Мет с пищей, напитками и алкоголем

Рекомендуется принимать таблетки во время еды. Это снизит вероятность расстройства желудка.

Не принимайте лекарственные препараты, содержащие спирт, во время лечения препаратом Глипвило Мет.

Откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя или препаратов, содержащих спирт, во время приема препарата Глипвило Мет.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, или предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение препарата во время беременности не рекомендуется.
Перед приемом каких-либо лекарственных препаратов во время беременности проконсультируйтесь с лечащим врачом. Лечащий врач сообщит о потенциальных рисках приема препарата Глипвило Мет во время беременности.

Грудное вскармливание

Применение препарата во время грудного вскармливания не рекомендуется.
Во время лечения препаратом Глипвило Мет кормить грудью не следует. Проконсультируйтесь с врачом перед приемом каких-либо лекарственных препаратов в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние фиксированной комбинации вилдаглиптин + метформин на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось. Препарат Глипвило Мет может оказывать слабое влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При развитии головокружения на фоне приема препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат Глипвило Мет содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 1 таблетку, то есть, по сути, «не содержит натрий».

3. Прием препарата Глипвило Мет

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Стандартная доза препарата Глипвило Мет составляет одну или две таблетки в день. Не следует принимать более двух таблеток в день.

В зависимости от ответа на лечение лечащий врач может увеличить или уменьшить дозу.

Если у Вас наблюдается снижение функции почек, то врач может назначить более низкую дозу. Также если Вы принимаете препараты группы сульфонилмочевины, лечащий врач может назначить более низкую дозу.

В зависимости от Вашего состояния врач назначит препарат Глипвило Мет в виде монотерапии или в комбинации с другими противодиабетическими препаратами.

Рекомендуемая суточная доза препарата Глипвило Мет составляет 2 таблетки – по 1 таблетке 2 раза в сутки, во время еды; однократный прием препарата показан только в качестве стартовой терапии у пациентов, не получавших вилдаглиптин или метформин ранее.

Особые группы пациентов

Пациенты с почечной недостаточностью

У пациентов со скоростью клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/м^2 перед началом терапии метформинсодержащими препаратами (такими как Глипвило Мет) следует оценить факторы, способствующие увеличению риска развития лактатацидоза. У пациентов со скоростью клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/м^2 применение препарата Глипвило Мет противопоказано, что обусловлено наличием метформина в составе препарата.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Принимайте препарат Глипвило Мет утром и (или) вечером во время еды. Прием таблетки во время еды или сразу после еды снизит риск возникновения расстройства желудка. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая водой.

Продолжительность терапии

Принимайте препарат Глипвило Мет в течение рекомендованного врачом времени.

Возможно, Вам придется принимать этот препарат в течение достаточно длительного периода. Врач будет регулярно контролировать Ваше состояние, чтобы убедиться, что лечение оказывает желаемый эффект.

Если лечащий врач отменил препарат Глипвило Мет по причине проблем с печенью, не следует возобновлять прием препарата.

Если у Вас есть вопросы о том, как долго принимать препарат Глипвило Мет, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы приняли препарата Глипвило Мет больше, чем следовало

Если Вы приняли больше таблеток препарата Глипвило Мет, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу; Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь. В этом случае возьмите упаковку препарата с собой, чтобы врач знал, какой препарат Вы принимаете.

Если Вы забыли принять препарат Глипвило Мет

Важно принимать препарат регулярно. Если Вы забыли принять препарат Глипвило Мет, примите его сразу, как только вспомните. Следующую дозу примите в обычное время. Если приближается время приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Глипвило Мет и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая серьезная нежелательная реакция из нижеперечисленных:

- ощущение холода и дискомфорта, боль в мышцах, сонливость, сильная тошнота или рвота, боль в животе, потеря массы тела неизвестной этиологии, головокружение, аритмия или учащенное дыхание (симптомы лактатацидоза). В случае возникновения таких симптомов следует прекратить прием препарата Глипвило Мет и немедленно связаться с врачом или обратиться за медицинской помощью, так как лактатацидоз может привести к коме;
- отек лица, живота или гортани, затрудненное глотание, затрудненное дыхание, внезапное появление сыпи или крапивницы (симптомы тяжелой аллергической реакции под названием «ангионевротический отек»);
- воспаление печени (гепатит), может проявляться пожелтением кожи, слизистых оболочек и белков глаз, тошнотой, потерей аппетита или темным цветом мочи;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), проявляющееся постоянной сильной болью в животе, которая может отдавать в спину, плохим самочувствием, тошнотой, рвотой;
- головная боль, сонливость, слабость, головокружение, спутанность сознания, раздражительность, ощущение голода, учащенное сердцебиение, потение, ощущение тревоги (возможные симптомы низкого содержания сахара в крови – гипогликемии).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Глипвило Мет

<u>В комбинации с инсулином</u>

Часто (могут возникать не более чем у 1 из 10 человек):

- головная боль;
- озноб;
- тошнота;
- заброс содержимого желудка в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс);
- снижение содержания сахара в крови (гипогликемия).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 из 100 человек):

- диарея;
- вздутие живота (метеоризм).

<u>В комбинации с препаратами сульфонилмочевины</u>

Часто (могут возникать не более чем у 1 из 10 человек):

- дрожь (тремор);
- головокружение;
- слабость с повышенной утомляемостью и нарушением сна (астения);
- повышенное потоотделение (гипергидроз);
- снижение содержания сахара в крови (гипогликемия).

<u>Монотерапия вилдаглиптином</u>

Часто (могут возникать не более чем у 1 из 10 человек):

- головокружение.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 из 100 человек):

- головная боль;
- опухание кистей рук, голеностопных суставов или ступней (периферические отеки);
- боль в суставах (артралгия);
- снижение содержания сахара в крови (гипогликемия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 из 10000 человек):

- боль в горле, насморк, лихорадка (возможные проявления инфекции (воспаления) верхних дыхательных путей, назофарингита).

<u>Монотерапия метформином</u>

Очень часто (могут возникать у более чем 1 из 10 человек):

- снижение аппетита;
- метеоризм;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боль в животе.

Часто (могут возникать не более чем у 1 из 10 человек):

- нарушение вкуса (дисгевзия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 из 10 000 человек):

- лактатацидоз;
- гепатит;
- покраснение (эритема);
- кожные реакции (в частности, покраснение (эритема), зуд, появление на коже

зудящих волдырей (крапивница));
- уменьшение всасывания витамина B_{12};
- изменение показателей функции печени.

В пострегистрационном периоде также сообщалось о возникновении нижеследующих нежелательных реакций

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных, оценить невозможно):

- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- воспаление печени (гепатит);
- повышение активности ферментов печени в крови;
- боль в мышцах (миалгия);
- боль в суставах (артралгия);
- появление на коже зудящих волдырей (крапивница);
- поражение кожи, сопровождающееся шелушением и образованием пузырей (эксфолиативное и буллезное поражения кожи), включая редкое хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся волдырями (буллезный пемфигоид);
- воспаление сосудов кожи (кожный васкулит);
- воспаление желчного пузыря (холецистит).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а
Телефон: + 375 (17) 242 00 29
Факс: +375 (17) 242 00 29
Адрес электронной почты: rcpl@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rceth.by

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»
Телефон: +7 7172 235 135
Адрес электронной почты: farm@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5
Телефон: (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 22 05 05
Адрес электронной почты: vigilance@pharm.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://pharm.am

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий
720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25
Телефон: + 996 (312) 21 92 86
Адрес электронной почты: pharm@dlsmi.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Глипвило Мет

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальном блистере для защиты от влаги.

Лекарственный препарат не требует специальных температурных условий хранения.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Глипвило Мет содержит

Действующими веществами препарата являются вилдаглиптин и метформин.

Глипвило Мет, 50 мг + 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг вилдаглиптина и 850 мг метформина гидрохлорида.

Глипвило Мет, 50 мг + 1000 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг вилдаглиптина и 1000 мг метформина гидрохлорида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гидроксипропилцеллюлоза, маннитол, натрия стеарилфумарат, магния стеарат, смесь для пленочного покрытия (гипромеллоза-2910 (6cP), титана диоксид (E171), тальк, пропиленгликоль), железа оксид желтый (E172).

Препарат Глипвило Мет содержит натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Глипвило Мет и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Глипвило Мет, 50 мг + 850 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, коричневато-желтого цвета, с маркировкой V1 на одной стороне.

Глипвило Мет, 50 мг + 1000 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, коричнево-желтого

цвета, с маркировкой V2 на одной стороне.

По 10 таблеток в блистере из комбинированного материала ОПА/Ал/ПВХ и фольги алюминиевой.

По 1, 3, 6 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Мультиупаковка: по 10 таблеток в блистере из комбинированного материала ОПА/Ал/ПВХ и фольги алюминиевой. По 6 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную. По 2 пачки картонных помещают в пачку картонную или по 3 пачки картонные скрепляют при помощи ленты из полиэтилена и помещают в пачку картонную.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «по рецепту».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Словения / Slovenia
АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Республика Беларусь
Представительство Акционерного общества «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Республика Словения) в Республике Беларусь
220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25Г, офис 315
Телефон: 8 740 740 9230
Факс: 8 740 740 9230
Адрес электронной почты: info.by@krka.biz

Республика Казахстан
ТОО «КРКА Казахстан»
050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601
Телефон: +7 (727) 311 08 09
Адрес электронной почты: info.kz@krka.biz

Республика Армения
Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения
0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103
Телефон: +374 11 560011
Адрес электронной почты: info.am@krka.biz

Кыргызская Республика
Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане
720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А
Телефон: +996 (312) 66 22 50
Адрес электронной почты: info.kg@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Июль 2026 г.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен на всех языках государств – членов Евразийского экономического союза в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).