Листок-вкладыш – информация для пациента

Панатус форте, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: бутамират

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается через 5–7 дней или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Панатус форте, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Панатус форте.
3. Прием препарата Панатус форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Панатус форте.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Панатус форте, и для чего его применяют

Препарат Панатус форте содержит действующее вещество бутамират, относится к группе «препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; противокашлевые средства, кроме комбинаций с отхаркивающими средствами; другие противокашлевые средства».

Показания к применению

Препарат применяется для симптоматического лечения сухого кашля различного происхождения (этиологии) у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет.

Способ действия препарата Панатус форте

Препарат Панатус форте – это препарат, содержащий в качестве действующего вещества бутамират, который является неопиоидным препаратом для подавления кашля и не формирует зависимости или привыкания. Препарат подавляет кашель, обладая прямым влиянием на кашлевой центр, расширяет бронхи, способствует облегчению дыхания, снижая сопротивление дыхательных путей, и насыщению крови кислородом.

Если улучшение не наступило через 5–7 дней или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Панатус форте

Противопоказания

Не принимайте препарат Панатус форте:

- если у Вас аллергия на бутамират или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- одновременно с отхаркивающими препаратами;
- если Вы беременны (I триместр) или кормите грудью (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- в возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Панатус форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это особенно важно, если Вы беременны (II–III триместры) (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»).

Если после 5–7 дней применения препарата Панатус форте кашель не прекращается, обратитесь к врачу.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 12 лет (см. подраздел «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Панатус форте

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Какие-либо лекарственные взаимодействия для препарата Панатус форте не описаны.

В связи с тем, что бутамират подавляет кашлевой рефлекс, не принимайте препарат Панатус форте одновременно с отхаркивающими средствами во избежание скопления мокроты в дыхательных путях.

В период применения препарата Панатус форте не рекомендуется применение лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (снотворные, нейролептики, транквилизаторы и другие). Вы можете уточнить у лечащего врача, какие препараты к ним относятся.

Препарат Панатус форте с алкоголем

В период применения препарата Панатус форте не рекомендуется применение алкоголя. Обсудите это с лечащим врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Панатус форте в I триместре беременности. Во II и III триместрах беременности прием препарата возможен только после консультации с врачом.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Панатус форте в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Панатус форте может вызывать сонливость и головокружение.

Соблюдайте осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Панатус форте содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Панатус форте

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

По 1 таблетке 2–3 раза в день.

Применение у детей и подростков

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет

По 1 таблетке 1–2 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Для приема внутрь. Принимайте препарат перед едой.

Продолжительность терапии

Если кашель сохраняется более 5–7 дней, обратитесь к врачу.

Если Вы приняли препарата Панатус форте больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Панатус форте больше, чем следовало, у Вас могут появиться сонливость, головокружение, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, раздражительность, нарушение координации движений, снижение артериального давления.

При подозрении на передозировку проводят промывание желудка, принимают активированный уголь и поддерживают жизненно важные функции организма. Специфического антидота нет.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Панатус форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Панатус форте

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- сонливость;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- частый жидкий стул (диарея);
- высыпания на коже, сопровождающиеся зудом (экзантема);

- высыпания на коже в виде волдырей, сопровождающиеся зудом (крапивница), возможно развитие аллергических реакций.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Панатус форте

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Панатус форте содержит

Действующим веществом является бутамират.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг бутамирата цитрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, повидон К-25, гипромеллоза 15000 мПас, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, гипромеллоза 6 мПас, титана диоксид (Е171), краситель железа оксид красный (Е172), пропиленгликоль.

Препарат Панатус форте содержит лактозу (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Панатус форте и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые, двояковыпуклые таблетки с фаской, покрытые пленочной оболочкой красно-коричневого цвета.

Вид на изломе: белая шероховатая масса с пленочной оболочкой красно-коричневого цвета.

По 10 таблеток в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги (PVC/Al-foil).

По 1 блистеру вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «без рецепта».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Словения / Slovenia
АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Август 2026 г.

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).