

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К. А. Савенков
06 октября 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Рикарфа®

(организация-разработчик: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia)

Номер регистрационного удостоверения: 705-3-21.26-5603№ПВИ-3-21.26/06070

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Рикарфа® (Rycarfa®).

Международное непатентованное наименование: карпрофен.

2. Лекарственная форма: раствор для внутривенного и подкожного введения.

Рикарфа® в 1 мл содержит действующее вещество карпрофен – 50 мг и вспомогательные вещества: аргинин, гликохолевую кислоту, лецитин, бензиловый спирт, натрия гидроксид, хлористоводородную кислоту концентрированную и воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным во флаконы из темного стекла объемом 20 мл, укупоренные резиновой пробкой, обжатой алюминиевым колпачком. Флаконы помещают поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 8 °С. После первого вскрытия флакона препарат хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать!

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат Рикарфа® относится к группе нестероидных противовоспалительных средств.

10. Карпрофен, входящий в состав лекарственного препарата Рикарфа®, обладает противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Как и другие нестероидные противовоспалительные средства, ингибирует циклооксигеназу в цикле арахидоновой кислоты, влияя преимущественно на циклооксигеназу-II, которая индуцируется в ответ на развитие воспаления. В результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, отек и боль. В терапевтических дозах карпрофен значительно слабее действует на циклооксигеназу-I и благодаря этому не оказывает влияния на синтез протективных простагландинов. Таким образом, карпрофен не препятствует нормальным физиологическим процессам в тканях, желудке, кишечнике, почках и тромбоцитах.

Карпрофен быстро всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей; более чем на 99 % карпрофен связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени, выделяется в основном с фекалиями (около 80 %) и частично с мочой. Время полувыведения карпрофена из организма собак составляет около 8 часов, у кошек - около 19 часов.

Рикарфа® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Рикарфа® применяют собакам и кошкам для снятия болевых и воспалительных реакций после оперативных вмешательств, для чего препарат вводится во время премедикации или при проведении анестезии.

12. Запрещается внутримышечное введение животным лекарственного препарата Рикарфа®. Животным с заболеваниями сердца, почек и печени, желудочно-кишечного тракта препарат следует назначать с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача. Запрещается использовать препарат после хирургических операций, связанных со значительной кровопотерей.

13. При работе с лекарственным препаратом Рикарфа® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с препаратом следует тщательно вымыть теплой водой с мылом лицо и руки.

Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Рикарфа®. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо немедленно промыть большим количеством воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и/или

этикетку).

14. Лекарственный препарат Рикарфа® не рекомендуется использовать беременным животным, животным в период лактации, а также животным моложе 6-недельного возраста.

15. Лекарственный препарат Рикарфа® собакам применяют внутривенно или подкожно в дозе 4,0 мг/кг карпрофена (1 мл препарата на 12,5 кг массы животного). Для продления анальгезии препарат вводят повторно через 24 часа в половинной дозе (2 мг карпрофена на 1 кг массы).

В случае необходимости дальнейшей терапии, лечение может быть продолжено назначением препарата Рикарфа® таблетки со вкусом мяса.

Кошкам препарат вводят однократно внутривенно или подкожно в дозе 4,0 мг/кг карпрофена (0,24 мл препарата на 3 кг массы животного).

16. Как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов, после применения препарата Рикарфа® у отдельных животных в редких случаях возможно снижение аппетита, диарея, рвота, поражение слизистой желудочно-кишечного тракта, изменение почечных биохимических показателей. В этом случае необходимо прекратить применение препарата и обратиться к ветеринарному врачу. В редких случаях возможно развитие воспалительного процесса в месте инъекции. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и проводят симптоматическую терапию.

17. При передозировке лекарственного препарата у собак могут наблюдаться симптомы расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта, такие как рвота и диарея.

18. Лекарственный препарат Рикарфа® совместим с лекарственными препаратами, применяемыми при премедикации и анестезии собакам и кошкам. Не следует назначать препарат одновременно с другими противовоспалительными или нефротоксическими препаратами, а также в течение 24 часов до их применения и 24 часов после окончания их применения.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения рекомендуемого интервала между введениями препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска повторного введения препарат следует ввести как можно скорее в предусмотренной дозе.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

Держатель РУ/Производитель:
АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата для ветеринарного
применения на принятие претензий от
потребителя

ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Московская, д. 50
Тел.: +7 (495) 994-70-70
Факс: +7 (495) 994-70-78
Адрес эл. почты: krka-rus@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz