

Листок-вкладыш – информация для пациента

Визарсин, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Визарсин, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Визарсин, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: силденафил

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Визарсин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин.
3. Прием препарата Визарсин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Визарсин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Визарсин, и для чего его применяют

Препарат Визарсин содержит действующее вещество силденафил. Относится к группе препаратов, которые называются «средства, применяемые в урологии; средства для лечения эректильной дисфункции». Препарат применяется у взрослых мужчин для лечения импотенции (эректильной дисфункции). При этом нарушении мужчина не может достигнуть эрекции или сохранить ее на уровне, достаточном для совершения полноценного полового акта.

Показания к применению

Препарат Визарсин применяется у взрослых мужчин в возрасте от 18 лет с эректильной дисфункцией, характеризующейся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта.

Силденафил эффективен только при сексуальной стимуляции.

Способ действия препарата Визарсин

При сексуальном возбуждении препарат Визарсин способствует большему расслаблению гладкой мускулатуры кровеносных сосудов и увеличивает приток крови к половому члену.

Препарат Визарсин поможет Вам достичь эрекции только при наличии сексуальной стимуляции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин

Противопоказания

Не принимайте препарат Визарсин:

- если у Вас аллергия на силденафил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы постоянно или с перерывами принимаете препараты, называемые нитратами (препараты для лечения боли в области сердца (стенокардии) или сердечного приступа), поскольку одновременный прием может привести к опасному снижению артериального давления. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете любые препараты для лечения стенокардии. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом;
- если Вы постоянно или с перерывами принимаете препараты, относящиеся к донаторам оксида азота (препараты, повышающие уровень оксида азота), такие как амилнитрит (так называемый «попперс»), так как одновременный прием может привести к опасному снижению артериального давления;
- если Вы принимаете стимуляторы гуанилатциклазы, например, риоцигуат. Этот препарат применяется для лечения высокого артериального давления в легких (легочной артериальной гипертензии) и высокого артериального давления в легких вследствие сужения и закупорки легочных артерий кровяными сгустками (хронической тромбоэмболической легочной гипертензии). Одновременный прием препарата Визарсин усиливает снижение артериального давления, вызванное риоцигуатом. Если Вы принимаете риоцигуат или у Вас есть сомнения, сообщите об этом лечащему врачу;
- если у Вас тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как тяжелая сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия;
- если у Вас были эпизоды потери зрения на один глаз в результате повреждения зрительного нерва (неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва);
- если у Вас тяжелое заболевание печени;
- если у Вас артериальное давление ниже 90/50 мм рт.ст. (артериальная гипотензия);
- если Вы в последние 6 месяцев перенесли инсульт или инфаркт миокарда;
- если у Вас редкое наследственное заболевание сетчатки глаз (наследственный пигментный ретинит).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Визарсин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если любое из состояний или заболеваний, перечисленных ниже, относится к Вам:

- заболевание сердца или тяжелое нарушение регуляции артериального давления. Лечащий врач проверит, может ли Ваше сердце выдержать дополнительную нагрузку во время полового акта и незначительного снижения артериального давления в результате приема препарата Визарсин;
- имеются факторы риска развития длительной и иногда болезненной эрекции (приапизма):
 - аномалия красных кровяных клеток крови – эритроцитов (серповидно-клеточная анемия);
 - злокачественное заболевание костного мозга (множественная миелома);
 - злокачественное заболевание крови с неконтролируемым увеличением незрелых белых кровяных клеток лейкоцитов (лейкемия);
- низкое количество тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- искривление полового члена (ангуляция);
- замещение нормальной (кавернозной) ткани пещеристых тел полового члена уплотненной соединительной тканью, сопровождающееся болью при эрекции и снижением потенции (кавернозный фиброз);

- деформация полового члена или боль и искривление полового члена при эрекции за счет образования в нем плотных бляшек (болезнь Пейрони);
- имеются факторы риска развития кровотечения:
 - в настоящее время имеется обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;
 - проблемы со свертывающей системой крови (например, склонность к кровоточивости);
- заболевание печени. Лечащий врач может уменьшить дозу препарата;
- тяжелое заболевание почек (лабораторный показатель крови – клиренс креатинина менее 30 мл/мин). Лечащий врач может уменьшить дозу препарата.

Не рекомендуется принимать препарат Визарсин вместе с препаратами для лечения легочной артериальной гипертензии, содержащими силденафил или другие ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Не рекомендуется принимать препарат Визарсин совместно с любыми другими препаратами для лечения эректильной дисфункции как наружного применения, так и для приема внутрь.

При внезапном ухудшении или потере зрения прекратите прием препарата Визарсин и немедленно обратитесь к врачу в ближайшее лечебное учреждение.

Не рекомендуется принимать препарат Визарсин вместе с ритонавиром (противовирусный препарат).

Препарат Визарсин не предназначен для применения у женщин.

Дети и подростки

Препарат Визарсин не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет.

Другие препараты и препарат Визарсин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Визарсин может влиять на действие некоторых препаратов, особенно препаратов для лечения боли в груди (стенокардии). В случае развития ситуации, требующей оказания неотложной медицинской помощи, сообщите врачу о приеме препарата Визарсин и времени его приема.

Не принимайте препарат Визарсин одновременно со следующими препаратами:

- никорандил или препараты, относящиеся к группе нитратов, поскольку одновременное применение с ними может привести к опасному снижению артериального давления. Обязательно сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какой-либо препарат для лечения боли в груди (стенокардия);
- донаторы оксида азота, такие как амилнитрит (так называемый «попперс»), так как одновременное применение с ними также может привести к опасному снижению артериального давления;
- риоцигуат, так как это может привести к опасному снижению артериального давления.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете следующие препараты:

- ритонавир (противовирусный препарат для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)). Не рекомендуется одновременный прием. При необходимости одновременного приема лечащий врач порекомендует не превышать дозу препарата Визарсин 25 мг в течение 48 часов;
- другие препараты для лечения нарушений эрекции (нет данных по безопасности и эффективности);

- ингибиторы ВИЧ-протеазы (например, саквинавир) (для лечения ВИЧ-инфекции). Лечащий врач может снизить начальную дозу препарата Визарсин до 25 мг;
- ингибиторы изофермента CYP3A4 (лечащий врач может снизить начальную дозу препарата Визарсин до 25 мг):
 - кетоконазол, итраконазол (для лечения грибковых заболеваний);
 - эритромицин (антибиотик);
 - циметидин (для лечения заболеваний органов пищеварительной системы);
- бозентан (для лечения легочной артериальной гипертензии) – возможно снижает эффект препарата Визарсин и увеличивается эффект бозентана;
- мощные индукторы изофермента CYP3A4, например, рифампицин (антибиотик для лечения туберкулеза) – возможно снижает эффект препарата Визарсин;
- альфа-адреноблокаторы для лечения высокого артериального давления или увеличенной предстательной железы (например, доксазозин). У Вас может появиться головокружение или предобморочное состояние. Это может быть вызвано снижением артериального давления после быстрого изменения положения тела «лежа» в положение «сидя» или «стоя». В редких случаях эти симптомы наблюдались при приеме препарата Визарсин вместе с альфа-адреноблокаторами. Это может произойти в течение 4 часов после приема препарата Визарсин. Чтобы снизить вероятность их развития принимайте регулярную ежедневную дозу альфа-адреноблокатора до приема препарата Визарсин;
- комбинация валсартан + сакубитрил (для лечения высокого артериального давления и заболеваний сердца) – возможно более выраженное снижение артериального давления.

Препарат Визарсин с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Визарсин можно принимать независимо от приема пищи. Однако, в случае приема препарата с большим количеством пищи, для начала действия препарата Визарсин может потребоваться больше времени.

Алкоголь

Употребление алкоголя может временно ухудшить способность к достижению эрекции. Для достижения максимального положительного эффекта не рекомендуется чрезмерное употребление алкоголя перед приемом препарата Визарсин.

Грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок может повышать концентрацию препарата в крови.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат Визарсин не предназначен для применения у женщин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При приеме препарата Визарсин может развиваться головокружение и ухудшиться зрение. Поэтому соблюдайте осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механизмами, Вам нужно выяснить, как Ваш организм реагирует на прием препарата Визарсин.

Препарат Визарсин содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Визарсин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 1 таблетку, покрытую пленочной оболочкой, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Визарсин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая начальная доза составляет 50 мг.

Не принимайте препарат Визарсин чаще одного раза в сутки.

При необходимости лечащий врач может увеличить дозу силденафила до 100 мг или уменьшить до 25 мг.

Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг в сутки.

Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, обратитесь к лечащему врачу.

Если препарат Визарсин не помогает достичь эрекции или эрекция длится недостаточно долго, чтобы завершить половой акт, обратитесь к лечащему врачу.

Если у Вас есть проблемы с почками или печенью, лечащий врач может снизить дозу препарата силденафила до 25 мг. В дальнейшем лечащий врач при необходимости может поэтапно увеличить дозу до 50 мг или 100 мг.

Путь и (или) способ введения

Принимайте препарат Визарсин внутрь примерно за один час до планируемого полового акта. Проглатывайте таблетку целиком, запивая стаканом воды.

Не принимайте препарат Визарсин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, совместно с препаратом Визарсин Ку-таб в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.

Препарат Визарсин поможет достичь эрекции только при наличии сексуальной стимуляции.

Отрезок времени, необходимый для того, чтобы препарат Визарсин начал действовать, отличается у разных людей, но обычно составляет от получаса до часа. Вы можете обнаружить, что для начала действия препарата Визарсин может понадобиться больше времени в случае его приема с большим количеством пищи.

Если Вы приняли препарата Визарсин больше, чем следовало

Незамедлительно обратитесь к врачу, так как может увеличиться количество и степень выраженности нежелательных реакций: головная боль, «приливы» крови, головокружение, нарушение пищеварения, заложенность носа, нарушение зрения. Дозы препарата, превышающие 100 мг, не увеличивают его эффективность.

Не превышайте дозу препарата Визарсин, рекомендованную лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Отмеченные нежелательные реакции, связанные с приемом препарата Визарсин, обычно легкой или умеренной степени тяжести и носят преходящий характер.

Прекратите прием препарата Визарсин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- аллергические реакции (реакции гиперчувствительности): внезапно развившееся свистящее дыхание, затруднение дыхания или головокружение, отек век, лица, губ или горла, кожная сыпь;
- боль в груди. Если боль появилась во время или после полового акта:
 - примите положение «полусидя» и постарайтесь расслабиться;
 - не принимайте нитраты для лечения боли в груди.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- длительная и иногда болезненная эрекция (приапизм). Если эрекция длится более 4 часов, немедленно обратитесь к врачу;
- нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся мышечной слабостью, нарушением речи, подвижности рук и ног, походки и ориентации в пространстве, онемением лица и лицевой асимметрией (острое нарушение мозгового кровообращения);
- преходящее нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся мышечной слабостью, нарушением речи, подвижности рук и ног, походки и ориентации в пространстве, онемением лица и лицевой асимметрией и другое (транзиторная ишемическая атака);
- судороги, в том числе повторные;
- внезапная коронарная смерть;
- сердечный приступ (инфаркт миокарда);
- впервые возникшая, прогрессирующая (с более интенсивными и продолжительными болевыми приступами) стенокардия или стенокардия покоя (нестабильная стенокардия);
- внезапное угрожающее жизни тяжелое нарушение ритма сердца с учащенным сердцебиением, резкой слабостью вплоть до потери сознания, одышкой, чувством страха, головокружением, болью в груди (желудочковая аритмия);
- тяжелое нарушение ритма сердца с учащенным сердцебиением, дискомфортом в груди, одышкой, головокружением, слабостью вплоть до потери сознания (фибрилляция предсердий);
- безболезненное внезапное снижение зрения вплоть до его потери за счет острого нарушения кровообращения в сосудах зрительного нерва и частичной или полной атрофии зрительного нерва (неартериитная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва);
- внезапная тяжелая кожная токсико-аллергическая реакция с высыпаниями и пузырями на коже и слизистых оболочках с последующим отслаиванием, с образованием язв слизистой оболочки полости рта, наружных половых органов и глаз, лихорадкой, болью в мышцах и суставах (синдром Стивенса-Джонсона);
- внезапное тяжелое угрожающее жизни аллергическое заболевание с образованием обширных волдырей на коже, шелушением кожи и поражением внутренних органов (токсический эпидермальный некролиз).

Другие нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Визарсин

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- головная боль.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- нарушение зрения;
- головокружение;
- нарушение восприятия цвета;
- нечеткость зрения;

- покраснение кожи (гиперемия кожи);
- внезапное чувство жара в верхней части тела («приливы» крови);
- заложенность носа;
- тошнота;
- нарушение пищеварения (диспепсия).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- насморк (ринит);
- сонливость;
- пониженная чувствительность к внешним раздражителям, неприятное ощущение онемения (гипестезия);
- нарушения слезоотделения;
- боль в глазу;
- светобоязнь (фотофобия);
- появление в поле зрения беспредметных образов: движущихся точек, пятен, фигур, молний, чаще светящихся, блестящих (фотоопсия);
- покраснение глаз (гиперемия глаз);
- изменение яркости световосприятия;
- воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);
- ощущение вращения тела и предметов (вертиго);
- шум в ушах;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- ощущение сердцебиения;
- высокое артериальное давление (артериальная гипертензия);
- низкое артериальное давление (артериальная гипотензия);
- носовое кровотечение;
- заложенность носа (заложенность придаточных пазух носа);
- заболевание, при котором соляная кислота забрасывается обратно из желудка в пищевод, сопровождается изжогой (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь);
- рвота;
- боль в верхней части живота;
- сухость во рту;
- сыпь;
- боль в мышцах (миалгия);
- боль в руках и ногах;
- наличие крови в моче (гематурия);
- повышенная утомляемость;
- ощущение жара;
- увеличение частоты сердечных сокращений выше нормы.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- обморок;
- нарушение проходимости (окклюзия) сосудов сетчатки;
- кровоизлияние в сетчатку глаза;
- атеросклероз сосудов сетчатки глаза, сопровождающийся снижением остроты зрения, головными болями, нарушением зрения, появлением мушек и пятен в глазах (артериосклеротическая ретинопатия);
- поражение сетчатки глаза;
- повышение внутриглазного давления (глаукома);
- выпадение полей зрения (дефект полей зрения);

- двоение в глазах (диплопия);
- снижение остроты зрения;
- близорукость (миопия);
- зрительное переутомление (астенопия);
- образования в виде пятен различной формы (мушки и молнии), которые человек видит перед глазами (плавающие помутнения стекловидного тела);
- поражение радужной оболочки;
- расширение зрачка (мидриаз);
- наличие в поле зрения радужных кругов вокруг источников света;
- отек глаза;
- припухлость глаза;
- нарушение со стороны органа зрения;
- покраснение белка глаз (гиперемия конъюнктивы);
- раздражение глаз;
- необычное ощущение в глазу;
- отек век;
- изменение цвета склеры;
- глухота;
- чувство стеснения в горле;
- отек слизистой оболочки полости носа;
- сухость слизистой оболочки полости носа;
- снижение чувствительности во рту (гипестезия слизистой оболочки полости рта);
- кровотечение из полового члена;
- наличие крови в семенной жидкости (гематоспермия);
- длительная эрекция;
- раздражительность.

Сердечно-сосудистые осложнения

Сообщалось о редких случаях впервые возникшей или с более интенсивными и продолжительными болевыми приступами стенокардии или стенокардии покоя (нестабильной стенокардии), сердечного приступа (инфаркта миокарда) и внезапной коронарной смерти. У большинства, но не у всех мужчин с указанными нежелательными реакциями, были заболевания сердца и до приема данного препарата. Невозможно определить, были ли эти явления непосредственно связаны с приемом силденафила.

Нарушения со стороны органа зрения

В редких случаях при применении силденафила сообщалось о неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва – редком заболевании, которое может быть причиной снижения или потери зрения. У большинства из этих пациентов были факторы риска, в частности: отек диска зрительного нерва, возраст старше 50 лет, сахарный диабет, повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия), ишемическая болезнь сердца, повышенная концентрация жиров в крови (гиперлипидемия) и курение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»

Телефон: +7 7172 235 135

Адрес электронной почты: farm@dari.kz

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.ndda.kz>

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5

Телефон: (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 22 05 05

Адрес электронной почты: vigilance@pharm.am

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pharm.am>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий

720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25

Телефон: +996 (312) 21 92 86

Адрес электронной почты: pharm@dlsmi.kg

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.dlsmi.kg>

5. Хранение препарата Визарсин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальном блистере.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию или водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Визарсин содержит

Действующим веществом является силденафил.

Визарсин, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 25 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрокристаллическая (авицел РН 102), магния стеарат, гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид, триацетин.

Визарсин, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза

микrokристаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микrokристаллическая (авицел РН 102), магния стеарат, гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид, триацетин.

Визарсин, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 100 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микrokристаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микrokристаллическая (авицел РН 102), магния стеарат, гипромеллоза, лактозы моногидрат, титана диоксид, триацетин.

Препарат Визарсин содержит лактозу и натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Визарсин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Визарсин, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 25.

Визарсин, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 50.

Визарсин, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 100.

По 1, 2, 4 таблетки в блистере из ПВХ – фольги алюминиевой.

По 1 блистеру (блистер по 1, 2, 4 таблетки), по 2 или 3 блистера (блистер по 4 таблетки) помещают в пачку картонную вместе с листком-вкладышем.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «по рецепту».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Словения / Slovenia

АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

Телефон: +7 (495) 994 70 70

Факс: +7 (495) 994 70 78

Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Республика Казахстан

ТОО «КРКА Казахстан»

050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601

Телефон: +7 (727) 311 08 09

Адрес электронной почты: info.kz@krka.biz

Республика Армения

Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения

0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103

Телефон: +374 11 560011

Адрес электронной почты: info.am@krka.biz

Кыргызская Республика

Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане

720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А

Телефон: +996 (312) 66 22 50

Адрес электронной почты: info.kg@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Август 2026 г.

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru>
(https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).