

Листок-вкладыш – информация для пациента
Визарсин® , 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Визарсин® , 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Визарсин® , 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Действующее вещество: силденафил

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Визарсин®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин®.
3. Прием препарата Визарсин®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Визарсин®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Визарсин®, и для чего его применяют

Препарат Визарсин® содержит действующее вещество силденафил и относится к препаратам для лечения эректильной дисфункции (импотенции) у взрослых мужчин. При наступлении полового возбуждения препарат Визарсин® вызывает расслабление гладкой мускулатуры кровеносных сосудов и увеличивает приток крови к половому члену.

При эректильной дисфункции невозможно достичь или сохранить эрекцию, достаточную для удовлетворительного полового акта.

Препарат Визарсин® поможет Вам достичь эрекции только при наличии сексуальной стимуляции.

Показания к применению

Препарат Визарсин® показан к применению у взрослых мужчин от 18 лет и старше для лечения нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта.

Силденафил эффективен только при сексуальной стимуляции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение во время приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин®

Противопоказания

Не принимайте препарат Визарсин®, если:

- у Вас аллергия на силденафил или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- Вы постоянно или с перерывами принимаете следующие препараты: донаторы оксида азота (препараты, повышающие уровень оксида азота), такие как амилнитрит; органические нитраты или нитриты в любых формах (препараты для лечения боли в области сердца (стенокардия) или сердечного приступа), поскольку одновременный прием может привести к опасному снижению артериального давления. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете любые из препаратов, которые часто назначают для лечения стенокардии. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с Вашим врачом или работником аптеки;
- Вы одновременно принимаете стимуляторы гуанилатциклазы, например, риоцигуат. Этот препарат применяется для лечения легочной артериальной гипертензии (то есть высокого артериального давления в легких) и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (то есть высокого артериального давления в легких вследствие сужения и закупорки легочных артерий кровяными сгустками). Одновременное применение этих препаратов усиливает снижение артериального давления. Если Вы принимаете риоцигуат или есть сомнения, сообщите об этом врачу;
- Вы одновременно принимаете другие препараты для лечения нарушений эрекции,

так как безопасность и эффективность приема силденафила в подобных комбинациях не изучалась;

- у Вас непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- у Вас тяжелое заболевание сердца или печени;
- Вы одновременно принимаете ритонавир (противовирусный препарат);
- Вам не рекомендуется сексуальная активность (например, у Вас тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как нестабильная стенокардия или хроническая сердечная недостаточность тяжелой степени);
- Вы в течение последних 6 месяцев перенесли инфаркт миокарда или инсульт или у Вас наблюдаются жизнеугрожающие тяжелые нарушения ритма сердца (аритмия), низкое артериальное давление менее 90/50 мм рт. ст. (артериальная гипотензия) или высокое артериальное давление более 170/100 мм рт. ст. (артериальная гипертензия);
- у Вас когда-либо ранее была потеря зрения на один глаз на фоне неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва (состояние, включающее потерю зрения из-за повреждения зрительного нерва);
- у Вас имеются некоторые наследственные заболевания сетчатки глаза, в том числе пигментный ретинит;
- Вы младше 18 лет;
- Вы – женщина.

Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам, обязательно сообщите об этом врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Визарсин® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если любое из состояний или заболеваний, перечисленных ниже, относится к Вам:

- имеются аномалия эритроцитов (серповидно-клеточная анемия);
- имеется злокачественное заболевание белых клеток крови (лейкемия);
- имеется злокачественное заболевание костного мозга (множественная миелома);
- имеется деформация полового члена, в том числе болезнь Пейрони;

- имеется заболевание сердца. Ваш врач проверит, может ли Ваше сердце выдержать дополнительную нагрузку во время полового акта;
- в настоящее время имеется язва желудка;
- имеются проблемы со свертывающей системой крови (например, гемофилия).

При внезапном ухудшении или потере зрения прекратите принимать препарат Визарсин® и немедленно обратитесь к врачу.

Не принимайте препарат Визарсин® совместно с другими препаратами для лечения эректильной дисфункции как местного действия, так и для приема внутрь.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с препаратами для лечения легочной артериальной гипертензии, содержащими силденафил или другие препараты для лечения эректильной дисфункции.

Не принимайте препарат Визарсин®, если у Вас нет эректильной дисфункции.

Препарат Визарсин® применяется только у мужчин.

Особые указания для пациентов с заболеваниями печени или почек

Сообщите врачу, если у Вас есть заболевание почек или печени. Ваш врач может уменьшить дозу препарата.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте младше 18 лет.

Другие препараты и препарат Визарсин®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Визарсин® может влиять на действие некоторых препаратов, особенно препаратов для лечения боли в груди (стенокардия). В случае оказания неотложной медицинской помощи сообщите врачу, работнику аптеки или медицинской сестре о приеме препарата Визарсин® и времени его приема.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с другими препаратами без рекомендации врача.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с никорандилом или препаратами, относящимися к группе нитратов, поскольку одновременное применение с ними может привести к опасному снижению артериального давления. Обязательно сообщите своему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре, если Вы принимаете любые из препаратов, которые часто назначают для лечения боли в груди (стенокардия).

Не принимайте препарат Визарсин®, если Вы уже принимаете препараты, называемые

донаторы оксида азота, такие как амилнитрит, так как одновременное применение с ними также может привести к опасному снижению артериального давления.

Сообщите врачу, если Вы уже принимаете риоцигуат.

Если Вы принимаете препараты, известные как ингибиторы протеазы для лечения инфекций, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), некоторые антибиотики и противогрибковые препараты (эритромицин, кетоконазол, итраконазол) сообщите Вашему врачу. Ваш врач может начать лечение препаратом Визарсин® с наименьшей дозы (25 мг), назначить кратность применения не чаще 1 раза в 48 часов.

Если Вы принимаете альфа-адреноблокаторы для лечения высокого артериального давления или увеличенной предстательной железы (например, доксазозин), у Вас может появиться головокружение или предобморочное состояние. Это может быть вызвано снижением артериального давления после быстрого изменения положения тела из горизонтального в сидячее или вертикальное. В некоторых случаях эти симптомы наблюдались при приеме препарата Визарсин® вместе с альфа-адреноблокаторами. Это может произойти в течение 4 часов после приема препарата Визарсин®. Чтобы снизить вероятность их развития принимайте регулярную ежедневную дозу альфа-адреноблокатора до приема препарата Визарсин®. Ваш врач может начать лечение препаратом Визарсин® с наименьшей дозы (25 мг).

Сообщите врачу, если Вы принимаете циметидин (препарат для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки), рифампицин (антибиотик), бозентан (препарат для лечения легочной гипертензии).

Препарат Визарсин® с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Визарсин® можно принимать независимо от приема пищи. Однако, Вы можете заметить более медленное начало действия препарата Визарсин® после его приема с обильной пищей.

Алкоголь

Употребление алкоголя может временно ухудшить способность к достижению эрекции. Для достижения максимального положительного эффекта рекомендуется не употреблять чрезмерное количество алкоголя перед приемом препарата Визарсин®.

Грейпфрутовый сок

Не следует употреблять грейпфрутовый сок одновременно с препаратом Визарсин®, так как грейпфрутовый сок может привести к повышению уровня действующего вещества в крови и, как следствие, к повышению риска развития нежелательных реакций.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат Визарсин® не предназначен для применения у женщин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При приеме препарата Визарсин® может развиваться головокружение и снизиться способность видеть. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механизмами, Вы должны знать, как препарат Визарсин® действует на Вас.

Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Препарат Визарсин® содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 таблетке, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Визарсин®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача.

При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза составляет 50 мг 1 раз в сутки.

Не принимайте препарат Визарсин® чаще 1 раза в сутки.

При необходимости Ваш врач может увеличить дозу препарата Визарсин® до 100 мг или уменьшить до 25 мг.

Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг в сутки.

Препарат Визарсин® следует принимать примерно за один час до планируемого полового акта.

Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Визарсин® поможет достичь эрекции только при сексуальной стимуляции.

Продолжительность действия препарата Визарсин® индивидуальна для каждого человека, но обычно составляет от 30 минут до одного часа. После приема препарата с обильной пищей начало действия препарата Визарсин® более медленное.

Если препарат Визарсин® не помогает достичь эрекции или эрекция длится недостаточно

долго для завершения полового акта, обратитесь к лечащему врачу.

Нарушение функции почек или печени

При необходимости Ваш врач может снизить дозу препарата Визарсин® до 25 мг. Исходя из эффективности и переносимости препарата, Ваш врач может поэтапно увеличить дозу до 50 мг или 100 мг.

Способ применения

Внутрь. Проглотите таблетку целиком, запивая стаканом воды.

Если Вы приняли препарата Визарсин® больше, чем следовало

Незамедлительно обратитесь к лечащему врачу, так как возможно развитие более выраженных нежелательных реакций. Дозы выше 100 мг не увеличивают эффекта препарата.

Примите столько таблеток препарата Визарсин®, сколько Вам рекомендовал Ваш врач.

Если у Вас возникли вопросы по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Отмеченные нежелательные реакции, связанные с приемом препарата Визарсин®, обычно легкой или умеренной степени тяжести и короткие по продолжительности.

Прекратите прием препарата Визарсин® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- аллергические реакции: внезапно развившееся свистящее дыхание, затруднение дыхания или головокружение, отек век, лица, губ или горла;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- длительная и иногда болезненная эрекция (приапизм). Если эрекция длится более 4 часов, немедленно обратитесь к врачу;

- острое нарушение кровообращения в сосудах зрительного нерва, сопровождающееся безболезненным снижением остроты зрения или изменением полей зрения, а также частичной или полной атрофией зрительного нерва (неартериитная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва).
- тяжелые кожные реакции (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): кожная сыпь с образованием пузырей на коже (синдром Стивенса-Джонсона), тяжелое заболевание с поражением кожных покровов и слизистых оболочек аллергической природы (токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
- припадки или судороги, в том числе повторные;
- инсульт;
- нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, внезапная сердечная смерть, нарушение ритма сердца по типу желудочковая аритмия;
- боль в груди. Если боль появилась во время или после полового акта:
 - примите положение «полусидя» и постарайтесь расслабиться;
 - не принимайте нитраты для лечения боли в груди.

Другие нежелательные реакции

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):

- головная боль.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- нарушение восприятия цвета;
- нечеткость зрения;
- нарушение зрения;
- покраснение (гиперемия) лица, «приливы» крови (симптомы включают внезапное чувство жара в верхней части тела);
- заложенность носа;
- тошнота;
- расстройство пищеварения (диспепсия).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа с насморком, чиханием и заложенностью носа (ринит);

- сонливость;
- пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия);
- боль в области глаз;
- светобоязнь (фотофобия);
- появление в поле зрения беспредметных образов: движущихся точек, пятен, фигур, молний, чаще светящихся, блестящих (фотопсия);
- покраснение (гиперемия) глаз;
- изменение яркости световосприятия;
- воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);
- слезящиеся глаза;
- ощущение вращения тела и предметов (вертиго);
- шум в ушах;
- ощущение сердцебиения;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- снижение артериального давления (артериальная гипотензия);
- повышение артериального давления (артериальная гипертензия);
- носовое кровотечение;
- воспалительное заболевание слизистой оболочки околоносовых пазух (синусит);
- заложенность носа;
- заболевание, при котором соляная кислота из желудка попадает в пищевод (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (включая изжогу));
- рвота;
- боль в области живота;
- сухость во рту;
- кожная сыпь;
- боль в мышцах (миалгия);
- боль в руках и ногах;
- наличие крови в моче (гематурия);
- ощущение жара;
- повышенная утомляемость;
- боль в области грудной клетки.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая атака);

- обморок;
- нарушение проходимости (окклюзия) сосудов сетчатки;
- кровоизлияние в сетчатку глаза;
- повреждение сосудов сетчатки, вызванное атеросклерозом (артериосклеротическая ретинопатия);
- поражение сетчатки;
- интенсивная боль в глазу, снижение зрения, радужные круги вокруг источника света, головная боль и тошнота, вызванные повышением внутриглазного давления (глаукома);
- дефект поля зрения;
- двоение в глазах (диплопия);
- снижение остроты зрения;
- близорукость (миопия);
- утомляемость глаз (астенопия);
- плавающие помутнения стекловидного тела;
- поражение радужной оболочки;
- дальнозоркость (мидриаз);
- наличие в поле зрения радужных кругов вокруг источника света;
- отек глаза;
- припухлость глаза;
- нарушения со стороны глаз;
- покраснение (гиперемия) конъюнктивы;
- раздражение глаза;
- необычные ощущения в глазу;
- отек век;
- изменение цвета склеры;
- глухота;
- чувство стеснения в горле;
- сухость слизистой оболочки полости носа;
- отек слизистой оболочки носа;
- сухость слизистой оболочки полости носа;
- чувство онемения (гипестезия) в полости рта;
- кровотечение из полового члена;
- наличие крови в сперме (гематоспермия);

- длительная эрекция;
- раздражительность.

Сердечно-сосудистые осложнения

По данным применения сообщалось о случаях нестабильной стенокардии (серьезное заболевание сердца), сердечного приступа и внезапной смерти. У большинства, но не у всех мужчин с этими нежелательными явлениями были заболевания сердца до приема данного препарата. Невозможно определить, были ли эти явления непосредственно связаны с приемом препарата Визарсин®.

Нарушения со стороны органа зрения

В редких случаях при применении силденафила сообщалось о неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва – редком заболевании и причине снижения или потери зрения. У большинства из этих пациентов были факторы риска, в частности: отек диска зрительного нерва, возраст старше 50 лет, сахарный диабет, повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия), ишемическая болезнь сердца, повышенная концентрация жиров в крови (гиперлипидемия) и курение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Тел.: +7 (800) 550 99 03

Адрес эл. почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Веб-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Тел.: + 7 7172 235 135

Адрес эл. почты: farm@dari.kz

Веб-сайт: www.ndda.kz

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна»

Тел.: + 374 60 83 00 73

Адрес эл. почты: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am, letters@pharm.am

Веб-сайт: http://www.pharm.am

Кыргызская Республика

720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий

Тел.: + 996 (312) 21 92 86

Адрес эл. почты: dlsmi@pharm.kg

Веб-сайт: www.pharm.kg

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Визарсин®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов «Годен до:...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальном блистере.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Визарсин® содержит

Действующим веществом является силденафил.

Визарсин®, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 25 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза

микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

Оболочка пленочная

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

Визарсин®, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 50 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

Оболочка пленочная

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

Визарсин®, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 100 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

Оболочка пленочная

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

Внешний вид препарата Визарсин® и содержимое его упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Визарсин®, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 25.

Визарсин®, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 50.

Визарсин®, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированным на одной стороне числом 100.

По 1, 2, 4 таблетки в блистере из ПВХ – фольги алюминиевой.

По 1 блистеру (блистер по 1, 2, 4 таблетки), по 2 или 3 блистера (блистер по 4 таблетки) помещают в пачку картонную вместе с листком-вкладышем.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

Тел.: +7 (495) 994 70 70

Факс: +7 (495) 994 70 78

Адрес эл. почты: krka-rus@krka.biz

Республика Казахстан

ТОО «КРКА Казахстан»

050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601

Тел.: + 7 (727) 311 08 09

Адрес эл. почты: info.kz@krka.biz

Республика Армения

Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения

0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103

Тел.: + 374 11 560011

Адрес эл. почты: info.am@krka.biz

Кыргызская Республика

Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане

720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А

Тел.: + 996 (312) 66 22 50

Адрес эл. почты: info.kg@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

31 октября 2025 г.

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
<https://ees.eaeunion.org>.