

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**Визарсин® , 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**Визарсин® , 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**Визарсин® , 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
Действующее вещество: силденафил

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Визарсин®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин®.
3. Прием препарата Визарсин®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Визарсин®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### **1. Что из себя представляет препарат Визарсин®, и для чего его применяют**

Препарат Визарсин® содержит действующее вещество силденафил и относится к препаратам для лечения эректильной дисфункции (импотенции) у взрослых мужчин. При наступлении полового возбуждения препарат Визарсин® вызывает расслабление гладкой мускулатуры кровеносных сосудов и увеличивает приток крови к половому члену.

При эректильной дисфункции невозможно достичь или сохранить эрекцию, достаточную для удовлетворительного полового акта.

Препарат Визарсин® поможет Вам достичь эрекции только при наличии сексуальной стимуляции.

## **Показания к применению**

Препарат Визарсин® показан к применению у взрослых мужчин от 18 лет и старше для лечения нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта.

*Силденафил эффективен только при сексуальной стимуляции.*

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение во время приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О чем следует знать перед приемом препарата Визарсин®**

### **Противопоказания**

**Не принимайте препарат Визарсин®, если:**

- у Вас аллергия на силденафил или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- Вы постоянно или с перерывами принимаете следующие препараты: донаторы оксида азота (препараты, повышающие уровень оксида азота), такие как амилнитрит; органические нитраты или нитриты в любых формах (препараты для лечения боли в области сердца (стенокардия) или сердечного приступа), поскольку одновременный прием может привести к опасному снижению артериального давления. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете любые из препаратов, которые часто назначают для лечения стенокардии. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с Вашим врачом или работником аптеки;
- Вы одновременно принимаете стимуляторы гуанилатциклазы, например, риоцигуат. Этот препарат применяется для лечения легочной артериальной гипертензии (то есть высокого артериального давления в легких) и хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (то есть высокого артериального давления в легких вследствие сужения и закупорки легочных артерий кровяными сгустками). Одновременное применение этих препаратов усиливает снижение артериального давления. Если Вы принимаете риоцигуат или есть сомнения, сообщите об этом врачу;
- Вы одновременно принимаете другие препараты для лечения нарушений эрекции,

так как безопасность и эффективность приема силденафила в подобных комбинациях не изучалась;

- у Вас непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- у Вас тяжелое заболевание сердца или печени;
- Вы одновременно принимаете ритонавир (противовирусный препарат);
- Вам не рекомендуется сексуальная активность (например, у Вас тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, такие как нестабильная стенокардия или хроническая сердечная недостаточность тяжелой степени);
- Вы в течение последних 6 месяцев перенесли инфаркт миокарда или инсульт или у Вас наблюдаются жизнеугрожающие тяжелые нарушения ритма сердца (аритмия), низкое артериальное давление менее 90/50 мм рт. ст. (артериальная гипотензия) или высокое артериальное давление более 170/100 мм рт. ст. (артериальная гипертензия);
- у Вас когда-либо ранее была потеря зрения на один глаз на фоне неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва (состояние, включающее потерю зрения из-за повреждения зрительного нерва);
- у Вас имеются некоторые наследственные заболевания сетчатки глаза, в том числе пигментный ретинит;
- Вы младше 18 лет;
- Вы – женщина.

Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам, обязательно сообщите об этом врачу.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Визарсин® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если любое из состояний или заболеваний, перечисленных ниже, относится к Вам:

- имеются аномалия эритроцитов (серповидно-клеточная анемия);
- имеется злокачественное заболевание белых клеток крови (лейкемия);
- имеется злокачественное заболевание костного мозга (множественная миелома);
- имеется деформация полового члена, в том числе болезнь Пейрони;

- имеется заболевание сердца. Ваш врач проверит, может ли Ваше сердце выдержать дополнительную нагрузку во время полового акта;
- в настоящее время имеется язва желудка;
- имеются проблемы со свертывающей системой крови (например, гемофилия).

При внезапном ухудшении или потере зрения прекратите принимать препарат Визарсин® и немедленно обратитесь к врачу.

Не принимайте препарат Визарсин® совместно с другими препаратами для лечения эректильной дисфункции как местного действия, так и для приема внутрь.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с препаратами для лечения легочной артериальной гипертензии, содержащими силденафил или другие препараты для лечения эректильной дисфункции.

Не принимайте препарат Визарсин®, если у Вас нет эректильной дисфункции.

Препарат Визарсин® применяется только у мужчин.

#### Особые указания для пациентов с заболеваниями печени или почек

Сообщите врачу, если у Вас есть заболевание почек или печени. Ваш врач может уменьшить дозу препарата.

#### **Дети и подростки**

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте младше 18 лет.

#### **Другие препараты и препарат Визарсин®**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Визарсин® может влиять на действие некоторых препаратов, особенно препаратов для лечения боли в груди (стенокардия). В случае оказания неотложной медицинской помощи сообщите врачу, работнику аптеки или медицинской сестре о приеме препарата Визарсин® и времени его приема.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с другими препаратами без рекомендации врача.

Не принимайте препарат Визарсин® вместе с никорандилом или препаратами, относящимися к группе нитратов, поскольку одновременное применение с ними может привести к опасному снижению артериального давления. Обязательно сообщите своему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре, если Вы принимаете любые из препаратов, которые часто назначают для лечения боли в груди (стенокардия).

Не принимайте препарат Визарсин®, если Вы уже принимаете препараты, называемые

донаторы оксида азота, такие как амилнитрит, так как одновременное применение с ними также может привести к опасному снижению артериального давления.

Сообщите врачу, если Вы уже принимаете риоцигуат.

Если Вы принимаете препараты, известные как ингибиторы протеазы для лечения инфекций, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), некоторые антибиотики и противогрибковые препараты (эритромицин, кетоконазол, итраконазол) сообщите Вашему врачу. Ваш врач может начать лечение препаратом Визарсин® с наименьшей дозы (25 мг), назначить кратность применения не чаще 1 раза в 48 часов.

Если Вы принимаете альфа-адреноблокаторы для лечения высокого артериального давления или увеличенной предстательной железы (например, доксазозин), у Вас может появиться головокружение или предобморочное состояние. Это может быть вызвано снижением артериального давления после быстрого изменения положения тела из горизонтального в сидячее или вертикальное. В некоторых случаях эти симптомы наблюдались при приеме препарата Визарсин® вместе с альфа-адреноблокаторами. Это может произойти в течение 4 часов после приема препарата Визарсин®. Чтобы снизить вероятность их развития принимайте регулярную ежедневную дозу альфа-адреноблокатора до приема препарата Визарсин®. Ваш врач может начать лечение препаратом Визарсин® с наименьшей дозы (25 мг).

Сообщите врачу, если Вы принимаете циметидин (препарат для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки), рифампицин (антибиотик), бозентан (препарат для лечения легочной гипертензии).

### **Препарат Визарсин® с пищей, напитками и алкоголем**

Препарат Визарсин® можно принимать независимо от приема пищи. Однако, Вы можете заметить более медленное начало действия препарата Визарсин® после его приема с обильной пищей.

#### Алкоголь

Употребление алкоголя может временно ухудшить способность к достижению эрекции. Для достижения максимального положительного эффекта рекомендуется не употреблять чрезмерное количество алкоголя перед приемом препарата Визарсин®.

#### Грейпфрутовый сок

Не следует употреблять грейпфрутовый сок одновременно с препаратом Визарсин®, так как грейпфрутовый сок может привести к повышению уровня действующего вещества в крови и, как следствие, к повышению риска развития нежелательных реакций.

## **Беременность и грудное вскармливание**

Препарат Визарсин® не предназначен для применения у женщин.

## **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

При приеме препарата Визарсин® может развиваться головокружение и снизиться способность видеть. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механизмами, Вы должны знать, как препарат Визарсин® действует на Вас.

## **Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

## **Препарат Визарсин® содержит натрий**

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 таблетке, то есть, по сути, не содержит натрия.

## **3. Прием препарата Визарсин®**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача.

При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Рекомендуемая доза**

Рекомендуемая доза составляет 50 мг 1 раз в сутки.

***Не принимайте препарат Визарсин® чаще 1 раза в сутки.***

При необходимости Ваш врач может увеличить дозу препарата Визарсин® до 100 мг или уменьшить до 25 мг.

Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг в сутки.

Препарат Визарсин® следует принимать примерно за один час до планируемого полового акта.

Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Визарсин® поможет достичь эрекции только при сексуальной стимуляции.

Продолжительность действия препарата Визарсин® индивидуальна для каждого человека, но обычно составляет от 30 минут до одного часа. После приема препарата с обильной пищей начало действия препарата Визарсин® более медленное.

Если препарат Визарсин® не помогает достичь эрекции или эрекция длится недостаточно

долго для завершения полового акта, обратитесь к лечащему врачу.

#### Нарушение функции почек или печени

При необходимости Ваш врач может снизить дозу препарата Визарсин® до 25 мг. Исходя из эффективности и переносимости препарата, Ваш врач может поэтапно увеличить дозу до 50 мг или 100 мг.

#### **Способ применения**

Внутрь. Проглотите таблетку целиком, запивая стаканом воды.

#### **Если Вы приняли препарата Визарсин® больше, чем следовало**

Незамедлительно обратитесь к лечащему врачу, так как возможно развитие более выраженных нежелательных реакций. Дозы выше 100 мг не увеличивают эффекта препарата.

*Примите столько таблеток препарата Визарсин®, сколько Вам рекомендовал Ваш врач.*

Если у Вас возникли вопросы по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Отмеченные нежелательные реакции, связанные с приемом препарата Визарсин®, обычно легкой или умеренной степени тяжести и короткие по продолжительности.

**Прекратите прием препарата Визарсин® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций**

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- аллергические реакции: внезапно развившееся свистящее дыхание, затруднение дыхания или головокружение, отек век, лица, губ или горла;

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- длительная и иногда болезненная эрекция (приапизм). Если эрекция длится более 4 часов, немедленно обратитесь к врачу;

- острое нарушение кровообращения в сосудах зрительного нерва, сопровождающееся безболезненным снижением остроты зрения или изменением полей зрения, а также частичной или полной атрофией зрительного нерва (неартериитная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва).
- тяжелые кожные реакции (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): кожная сыпь с образованием пузырей на коже (синдром Стивенса-Джонсона), тяжелое заболевание с поражением кожных покровов и слизистых оболочек аллергической природы (токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
- припадки или судороги, в том числе повторные;
- инсульт;
- нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, внезапная сердечная смерть, нарушение ритма сердца по типу желудочковая аритмия;
- боль в груди. Если боль появилась во время или после полового акта:
  - примите положение «полусидя» и постарайтесь расслабиться;
  - не принимайте нитраты для лечения боли в груди.

#### **Другие нежелательные реакции**

**Очень часто** (могут возникать у более чем 1 человека из 10):

- головная боль.

**Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- нарушение восприятия цвета;
- нечеткость зрения;
- нарушение зрения;
- покраснение (гиперемия) лица, «приливы» крови (симптомы включают внезапное чувство жара в верхней части тела);
- заложенность носа;
- тошнота;
- расстройство пищеварения (диспепсия).

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа с насморком, чиханием и заложенностью носа (ринит);

- сонливость;
- пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия);
- боль в области глаз;
- светобоязнь (фотофобия);
- появление в поле зрения беспредметных образов: движущихся точек, пятен, фигур, молний, чаще светящихся, блестящих (фотопсия);
- покраснение (гиперемия) глаз;
- изменение яркости световосприятия;
- воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);
- слезящиеся глаза;
- ощущение вращения тела и предметов (вертиго);
- шум в ушах;
- ощущение сердцебиения;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- снижение артериального давления (артериальная гипотензия);
- повышение артериального давления (артериальная гипертензия);
- носовое кровотечение;
- воспалительное заболевание слизистой оболочки околоносовых пазух (синусит);
- заложенность носа;
- заболевание, при котором соляная кислота из желудка попадает в пищевод (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (включая изжогу));
- рвота;
- боль в области живота;
- сухость во рту;
- кожная сыпь;
- боль в мышцах (миалгия);
- боль в руках и ногах;
- наличие крови в моче (гематурия);
- ощущение жара;
- повышенная утомляемость;
- боль в области грудной клетки.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая атака);

- обморок;
- нарушение проходимости (окклюзия) сосудов сетчатки;
- кровоизлияние в сетчатку глаза;
- повреждение сосудов сетчатки, вызванное атеросклерозом (артериосклеротическая ретинопатия);
- поражение сетчатки;
- интенсивная боль в глазу, снижение зрения, радужные круги вокруг источника света, головная боль и тошнота, вызванные повышением внутриглазного давления (глаукома);
- дефект поля зрения;
- двоение в глазах (диплопия);
- снижение остроты зрения;
- близорукость (миопия);
- утомляемость глаз (астенопия);
- плавающие помутнения стекловидного тела;
- поражение радужной оболочки;
- дальнозоркость (мидриаз);
- наличие в поле зрения радужных кругов вокруг источника света;
- отек глаза;
- припухлость глаза;
- нарушения со стороны глаз;
- покраснение (гиперемия) конъюнктивы;
- раздражение глаза;
- необычные ощущения в глазу;
- отек век;
- изменение цвета склеры;
- глухота;
- чувство стеснения в горле;
- сухость слизистой оболочки полости носа;
- отек слизистой оболочки носа;
- сухость слизистой оболочки полости носа;
- чувство онемения (гипестезия) в полости рта;
- кровотечение из полового члена;
- наличие крови в сперме (гематоспермия);

- длительная эрекция;
- раздражительность.

#### Сердечно-сосудистые осложнения

По данным применения сообщалось о случаях нестабильной стенокардии (серьезное заболевание сердца), сердечного приступа и внезапной смерти. У большинства, но не у всех мужчин с этими нежелательными явлениями были заболевания сердца до приема данного препарата. Невозможно определить, были ли эти явления непосредственно связаны с приемом препарата Визарсин®.

#### Нарушения со стороны органа зрения

В редких случаях при применении силденафила сообщалось о неартериитной передней ишемической нейропатии зрительного нерва – редком заболевании и причине снижения или потери зрения. У большинства из этих пациентов были факторы риска, в частности: отек диска зрительного нерва, возраст старше 50 лет, сахарный диабет, повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия), ишемическая болезнь сердца, повышенная концентрация жиров в крови (гиперлипидемия) и курение.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена.

#### *Российская Федерация*

109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Тел.: +7 (800) 550 99 03

Адрес эл. почты: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Веб-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

#### *Республика Казахстан*

010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Тел.: + 7 7172 235 135

Адрес эл. почты: farm@dari.kz

Веб-сайт: www.ndda.kz

*Республика Армения*

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна»

Тел.: + 374 60 83 00 73

Адрес эл. почты: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am, letters@pharm.am

Веб-сайт: http://www.pharm.am

*Кыргызская Республика*

720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий

Тел.: + 996 (312) 21 92 86

Адрес эл. почты: dlsmi@pharm.kg

Веб-сайт: www.pharm.kg

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. Хранение препарата Визарсин®**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов «Годен до:...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальном блистере.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат Визарсин® содержит**

Действующим веществом является силденафил.

Визарсин®, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 25 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза

микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

*Оболочка пленочная*

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

Визарсин®, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 50 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

*Оболочка пленочная*

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

Визарсин®, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 100 мг силденафила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 101), кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, целлюлоза микрористаллическая (авицел РН 102), магния стеарат

*Оболочка пленочная*

Опадрай II 31K58875 белый: гипромеллоза, лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша подразделы «Препарат Визарсин® содержит лактозы моногидрат» и «Препарат Визарсин® содержит натрий»), титана диоксид, триацетин

**Внешний вид препарата Визарсин® и содержимое его упаковки**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Визарсин®, 25 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированной на одной стороне цифрой 25.

Визарсин®, 50 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированной на одной стороне цифрой 50.

Визарсин®, 100 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, с выгравированной на одной стороне цифрой 100.

По 1, 2, 4 таблетки в блистере из ПВХ – фольги алюминиевой.

По 1 блистеру (блистер по 1, 2, 4 таблетки), по 2 или 3 блистера (блистер по 4 таблетки) помещают в пачку картонную вместе с листком-вкладышем.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения**

*Российская Федерация*

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

Тел.: +7 (495) 994 70 70

Факс: +7 (495) 994 70 78

Адрес эл. почты: krka-rus@krka.biz

*Республика Казахстан*

ТОО «КРКА Казахстан»

050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601

Тел.: + 7 (727) 311 08 09

Адрес эл. почты: info.kz@krka.biz

*Республика Армения*

Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения

0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103

Тел.: + 374 11 560011

Адрес эл. почты: info.am@krka.biz

*Кыргызская Республика*

Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане

720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А

Тел.: + 996 (312) 66 22 50

Адрес эл. почты: info.kg@krka.biz

**Листок-вкладыш пересмотрен**

15 апреля 2024 г.

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза  
<https://eec.eaeunion.org>.